FOGLIO 599 PATTI

Servizio Geologico d'Italia (2023) - *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, F. 599 Patti*. ISPRA, Roma.
DOI: 10.15161/oar.it/143273

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Dipart. Sviluppo Sost. Dife. Suolo fit. Ln 217/2006

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Dai rilevamenti geologici 1:25.000

Regione Siciliana
Assessorato Territorio Ambiente

PATTI
FOGLIO 599

dalla Carta 1:50.000 dell'I.G.M.

RESPONSABILE DEL PROGETTO PER LA REGIONE SICILIA: G. Arcuno'
COORDINATORE SCIENTIFICO: G. Giunta' (aree emerse), R. Catalano' (aree marine)
REDAZIONE SCIENTIFICA: A. Giorgianni, S. Carbone' (aree emerse) - A. Sulli' (aree marine)
ANALISI BIOSTRATIGRAFICA: A. Di Stefano' (nannofossili), M. Marino' (foraminiferi/macrofossili) (aree emerse) - E.Collura' (aree marine)
ANALISI PETROGRAFICA: S. Russo', S. Aragona' (basamento), D. Puglisi' (sedimentario) (aree emerse)
ANALISI SISMOSTRATIGRAFICA: A. Asulfino', A. Sulli', R. Catalano' (aree marine)
ANALISI STRUTTURALE: D. Campisi, F. Sapio, E. Oliveri (aree emerse) - R. Catalano', A. Sulli' (aree marine)
ANALISI GEOMORFOLOGICA: A. Giorgianni (aree emerse) - D. Di Maio', G. Caputo' (aree marine)

SUDDIVISIONE DEI RILEVAMENTI GEOLOGICI ALLA SCALA 1:25.000
RILEVATORE: D. Campisi (a, A, Giorgianni (b), B. Li Bianchi (c),
A. Lombardo (d), F. Nigro (e), E. Oliveri (f), M. Orrù (g), V. Sparacio (h)
(aree emerse) - A. Asulfino' (i), E. Collura' (l), D. Di Maio' (m), A. Sulli' (n),
R. Catalano' (o), G. Caputo' (p) (aree marine).
DIRETTORE DEL RILEVAMENTO: S. Carbone' (aree emerse) - R. Catalano' (aree marine).
1) Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente
2) DiSTeM srl- Dip. di Geologia e Geodesia - Università di Palermo
3) Dip. di Scienze Geologiche - Università di Catania
4) Dip. di Scienze della Terra - Università di Messina
5) Dip. di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine - Università di Trieste
Servizianti e rilevatori ex novo dell'ex ensemble eseguiti negli anni 2000-2005

DEPOSITI QUATERNARI

DEPOSITI SOMMERSI

DEPOSITI DI PIATTAFORMA CONTINENTALE INTERNA (Pa)
Sabbie da grossolane a medio fini prevalentemente silico-clastiche e limi sabbiosi disposti in fasce parallele alla costa, con abbondanti gusci da tabulari a rari cuneiformi. Localmente rilasciabbiche ad alghe tipo Sporma.

DEPOSITI DI PIATTAFORMA CONTINENTALE ESTERNA (Pa)
Limi-sabbiosi contenenti bioclasti di molluschi, limi e fanghi disposti in corpi da cuneiformi a tabulari.

DEPOSITI DI SCARPATA (Ps)
Peliti ed argille con plancton calcareo e rara componente di bioclasti. A luoghi empilegiati. Corpi lentiformi, raramente cuneiformi.

SUPERSINTEMA NOEMI (NO)
Raggruppa i depositi compresi tra il Piacenziano e lo Ioniano, generalmente sepolti nei settori di piattaforma. Il limite inferiore, quando presente è discordante sul tetto dei Trubi o di terreni più antichi. Il limite superiore è rappresentato dalla base della Sequenza deposizionale tardo-Quaternaria.
PIACENZIANO-IONIANO

DEPOSITI CONTINENTALI E TRANSIZIONALI

DEPOSITI DI VERSANTE (Dt)
Deposito incoerente, raramente cementato, costituito da materiale eterometrico e spigoloso, localmente a grossi blocchi. Spessore variabile fino a decametrico.
OLOCENE

DEPOSITI DI FRANA (Dt)
Accumuli gravitativi caotici di materiali eterogenei ed eterometrici, localmente a grossi blocchi, in matrice da argillosa a sabbiosa a siltosa (talora sabbioso-limo-argillosa), ad argillitica e/o metaclastica se in terreni cristallini, a luoghi stabilizzati o senza indizi di evoluzione in atto.
OLOCENE

DEPOSITI DI SPIAGGIA (Sr)
Sabbie e ghiaie a clasti poligenici ed eterometrici, a grana da media a grossolana.
OLOCENE

DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI (b)
Ghiaie, sabbie e limi argillosi costituenti l'attuale alveo dei principali corsi d'acqua e delle fiumare. La frazione grossolana, eterometrica e poligenica, è costituita da clasti appiattiti e arrotondati o a spigoli vivi. Spessore fino a 20 m.
OLOCENE

DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI E DEPOSITI DI PIANA LITORALE (b)
Ghiaie costituite da clasti eterometrici e poligenici e sabbie grossolane a supporto di matrice limoso-argillosa di colore grigio-bruno (deposito di piana inondabile), passanti lateralmente a ghiaie in assetto stratoide, ubicate lungo fasce pedemontane (deposito di conoide alluvionale). Spessore dei pochi metri fino a 20 m.
OLOCENE

DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI (b)
Ghiaie poligeniche ed eterometriche, brune o giallastre a clasti prevalentemente arrotondati di diametro da 2-3 cm fino a 15-20 cm, sabbie e limi argillosi di spessore da metrico a decametrico, terrazzati in più ordini.
PLEISTOCENE medio - superiore

DEPOSITI MARINI E TRANSIZIONALI

DEPOSITI MARINI TERRAZZATI (Ba-t)
Sabbie giallo ocra talora ghiaiose, limi e ghiaie ad elementi eterometrici arrotondati ed appiattiti, immersi in matrice sabbiosa. La stratificazione è poco evidente. Costituiscono da 1 a 7 ordini di depositi terrazzati, distribuiti a quote diverse. Lo spessore in genere è modesto.
PLEISTOCENE medio - superiore

GHIAIE E SABBIE DI MESSINA (MES)
Sabbie, ghiaie e conglomerati di colore grigio-giallastro o rossastro, scarsamente cementati, clinostratificati ad alto angolo. I ciottoli, per lo più cristallini, sono generalmente arrotondati e di diametro compreso tra pochi centimetri ed il metro. Poggiano in discordanza su vari termini del substrato. Spessore fino a 75 m.
PLEISTOCENE medio

SUCCESSIONE DEL MIOCENE INFERIORE-PLEISTOCENE MEDIO DEI MONTI PELORITANI

DEPOSITI DEL PLIOCENE INFERIORE-PLEISTOCENE MEDIO

CALCARENITI DI SAN CORRADO (ORD, ORDa, ORDb)
Formazione costituita da quattro litofacies, dal basso verso l'alto: conglomerati poligenici grigio-giallastri ad elementi di diametro fino a 10 cm (ORDa), a livelli sabbioso bioclastici (ORDb). Spessore non superiore a 15 m. La litofacies conglomeratica passa eteropicamente a sabbie gialle debolmente siltose con sottili e rare intercalazioni calcarenitiche fossilifere (ORDc). Spessore da 0 m a 50 m. ORDa e ORDb sono eteropiche con un'alternanza di calcareniti giallastre e sabbie ocracee in strati di 20-50 cm, fossilifere, contenenti talora livelli decimetrici di micro-conglomerati quarzosi grigiastri non cementati (ORDc). Spessore massimo 130 m. Queste ultime passano verso l'alto ad un calcirudite grigiastra, talora limose, scarsamente fossilifere (ORDd), di spessore non superiore a 20 m. La rudite basale contiene foraminiferi della biozona a *Truncorotalia truncatulinoides excelsa* e nannofossili della biozona MNN19f.
PLEISTOCENE medio

FORMAZIONE DI ROMETTA (ROE)
Calcareniti giallo ocra a stratificazione incrociata o piano parallela, e subordinatamente sabbie organogene, con abbondanti livelli o lenti a macrofossili, rappresentati da pectinidi, brachiopodi e Ostree costituenti lag conchiglieri. Le associazioni a nannofossili, rare negli orizzonti calcarenitici, più comuni in quelli sabbiosi fini, sono riferibili alla biozona MNN19b, a *Globorotalia inflata* e *Neogloboquadrina pachyderma*. Spessore fino a 150 m.
PLEISTOCENE inferiore

TRUBI (TRB)
Marne e calcari marnosi di colore biancastro, in strati di 30-50 cm, con intercalazioni di lenti sabbiose. A luoghi è presente un livello basale conglomeratico a clasti metamorfici in matrice sabbiosa. Associazioni a nannofossili delle biozone MNN12 e MNN13. Foraminiferi delle biozone MP1, MP2 e MP3. Spessore massimo 70 m.
PLIOCENE inferiore

DEPOSITI CLASTICI ED EVAPORITICI DEL MIOCENE MEDIO-MESSINIANO

GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERO (GS)

CALCARE EVAPORITICO (GS)
Calcare biancastro massivo, generalmente brecciato e tipicamente vacuolare, talora con intercalazioni di lamelle carboniche. Spessore massimo 50-60 m
MESSINIANO superiore

FORMAZIONE DI S. PIER NICETO (PCT, PCTa, PCTb)
Depositi silicoclastici costituiti da tre litofacies con frequenti variazioni laterali e verticali. Alternanze di sabbie o arenaree e sottili livelli pelitico-marnosi (PCTa). Conglomerati poligenici a prevalenti elementi eterometrici metamorfici, in abbondante matrice da sabbioso-siltosa (PCTb). Marne argilloso-siltose grigio-brune a stratificazione indistinta (PCTc). Macrofaune oligotipiche ad ostreidi; associazioni a foraminiferi delle biozone a *O. altispira altispira* e *P. partimlabiata* e nannofossili delle biozone MNN6 e MNN7. La formazione poggia in discordanza su ASI e CFL. Spessore complessivo circa 100 m.
LANGHIANO superiore - MESSINIANO inferiore

DEPOSITI CALCAREI E MARNOSI DEL MIOCENE INFERIORE-MEDIO

MARNE DI M. PITO' (PIO)
Marne, argille grigie ed arenarie fini in strati sottili piano-paralleli. Nannofiore della biozona MNN5, e foraminiferi della biozona a *O. suturalis-G. peripheroronda*. Localmente affiorano in continuità su CFL. Spessore massimo 60 m.
LANGHIANO superiore

CALCARENITI DI FLORESTA (CFL)
Bioclastareniti bianco-grigiastre, generalmente a stratificazione incrociata, a frammenti di alghe, briozoi ed amphistegine; arcosi glauconitiche a cemento spatico, in strati da 20 cm a 2 m, alternate a livelli sottili argillosi, talora debolmente marnosi. Gli strati a granulometria più grossolana mostrano contatti erosionali alla base. Nella parte medio-alta della formazione i livelli argilloso-marnosi divengono più frequenti. Nell'area tipo, esterna al foglio, gli orizzonti basali contengono nannofossili delle biozone MNN3a e MNN3b e quelli medio-alti delle biozone MNN4a-MNN4b. Associazioni a foraminiferi con *Globigerinoides trilobus*, *Paragloborotalia siakensis*, *P. acrostoma* nei livelli basali; *Globigerinoides irregularis*, *Praeorbulina glomerosa glomerosa* e *P. glomerosa circularis* nei livelli sommitali. La formazione poggia in discordanza con giacitura down-lap su ASI e su C00. Spessore 80-100 m.
BURDIGALIANO superiore - LANGHIANO

UNITA' TETTONICA "ANTISICILIDE"

ARGILLE SCAGLIOSE DEI MONTI PELORITANI (ASI)
Argille varicolori, scagliettate e a luoghi a giacitura caotica, con intercalazioni di livelli sottili di calcari siltosi biancchi, siltiti carbonatiche grigie e argilliti siltose brune. Nelle argille nannofiore a *Ankhangelskiella cymbiformis*, *Braarudosphaera bigelowii*, *Calciulites obscurus*, *Cerathoilsoides aculeus*, *Micula concava*, *M. decussata*, *Watznaueria barnesae*. Spessore circa 100 m.
CRETACICO superiore

SUCCESSIONI TERRIGENE DELL'OLIGOCENE SUPERIORE-MIOCENE INFERIORE

FLYSCH DI CAPO D'ORLANDO (C00, C00a, C00b)
Successione costituita regionalmente da tre litofacies prevalenti, generalmente eteropiche o in alternanza: argillosa ($C00_a$), arenacea ($C00_b$) e conglomeratica ($C00_c$). Solo in rari casi è possibile interpretare un apoggio in continuità sul Flysch di Frazzanò (FRZ). Nell'area del foglio affiorano le litofacies $C00_b$ e $C00_c$. La litofacies arenacea ($C00_b$) è costituita da arkose e da arkose-litiche grigio-giallastre in strati da medi a megastrati, cui si intercalano livelli medio-spessi argilloso-marnosi. La litofacies conglomeratica ($C00_c$) è caratterizzata da corpi canalizzati di conglomerati poligenici ed eterometrici a prevalenti clasti cristallini e subordinatamente calcarei, a scarsa matrice arenacea. Localmente la frazione carbonatica è prevalente e costituisce brecce cementate grigio-biancastre a struttura massiva, in corpi canalizzati o sotto forma di olistoliti inglobati (bnl). Nella parte bassa della formazione sono state rinvenute nannoflore delle biozone MNP24 e MNP25a, che indicano un età Oligocene superiore. Nei livelli superiori è stata riconosciuta un'associazione di età inframiocenica per la presenza comune di *Helicosphaera carteri* (biozona MNN2a). Taluni livelli irregolari di breccie calcaree a matrice arenacea contengono *Nummulites* spp. Lo spessore complessivo è di circa 600 m.
OLIGOCENE superiore - BURDIGALIANO

SCHEMA TETTONICO





Copyright by ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - 2013
Da tipi dell'Istituto Geografico Militare (Autorizzazione IGM n. 4791 del 04/09/98)
Carta Ufficiale dello Stato, tutti i diritti di riproduzione e di relaborazione riservati
(Legge n. 68 del 2.2.1960)
Progetto CARG: Legge 305/1989
Direttore Responsabile: C. Campobasso

Sezione geologica ottenuta dall'interpretazione di profili sismici a riflessione che attraversano il settore offshore tra la piattaforma continentale e la scarpata superiore.

Sezione geosismica che attraversa il settore offshore tra la piattaforma continentale e la scarpata superiore, rappresentativa della Sequenza Deposizionale Tardo Quaternaria (SDTQ).

SCHEMA CRONOSTRATIGRAFICO

Stampa: SYSTEMCART Srl, Roma - 2013

Foglio con nota illustrativa

Banca dati ed allestimento cartografico digitale: Nadir S.a.s. di Antonio D'Argenio, Palermo

Pliocene inferiore - Pleistocene medio

Miocene inf. - Cretacico sup.

CONGLOMERATO ROSSO (GLO)
Conglomerati poligenici, a matrice prevalente di colore rossastro, con elementi eterometrici derivanti sia da rocce cristalline di vario grado, che da litotipi carbonatici mesozoici. Questi ultimi costituiscono anche grossi olistoliti (la) caratterizzati da dolomie grige e giallastre vacuolari, calcari cristallini pseudo-oolitici a breccie calcaree, comunemente associati microfaune/flore ad affinità tipo Oligocene superiore-Aquitaniano (cfr. "Rosso Ammonitico Superiore" *Auct.*). Il Rosso Ammonitico s.s. è stato riferito a lembi della breccia calcarea affioranti nell'area di Naso (Monte Naso - Auct.). In tutto l'affioramento i resti della breccia calcarea affiorano quasi esclusivamente nell'area di Aplici, in strati sottili con microfaune a Calpionelle del Titonico-Neocomiano e rarne silitose verdognole ecc rosse (Scaglia) in livelli molto sottili (1-2 cm), con impronte di fondo e tracce di Incoceteri, ascrivibili al Cretacico sup. I conglomerati sono ritenti, pertanto l'età è stata desunta per posizione stratigrafica. La formazione affiora irregolarmente alla base dei Flysch di Capo d'Orlando, cui passa gradualmente, e poggia in discordanza sulle unità sottostanti. Lo spessore varia da 0 a 100 m.
OLIGOCENE superiore?

CATENA KABILO-CALABRIDE (SETTORE PELORITANO)

UNITA' TETTONICA DELL'ASPROMONTE

Metamorfiti dell'Aspromonte
Sono costituite da un complesso metamorfico varisico (PMA) in facies anfibolitica (di AT e BMP), intruso da un complesso plutonico tardo-varisico (PMP), di composizione da intermedia ad acida, con svariprnnita metamorfica alpina dalla facies scisti verdi di BT a quella anfibolitica di MP e BT.

Paragneiss passanti a micascisti (PMA_a), con grana da grossa a minuta, tessitura da massiva a scistosa e struttura porfiroblastica, blastica, xenoblastica. Diffusi effetti migmatitici e Locali corpi di metabasiti, con anfiboliti prevalenti.

Gneiss occhiadini (PMA_b), localmente con metagranitoidi (a_1) associati, a grana medio-grossa, tessitura orientata con porfiroclasti centimetrici di K-feldspato in matrice a biotite, quarzo e feldspati. Al loro interno bande decimetriche concordanti di meta-pegmatiti e meta-aplititi, lembi di paragneiss e rari inclusi metagranulari femici. **Plutoniti** (PMP), in corpi e filoni di notevoli dimensioni, a grana da fine a media, tessitura massiva e composizione granodiorítico-monzogranitica. Contengono inclusi microgranulari bolitici e xenoliti metamorfici. **Marmi** impuri (PMA_m), a grana media e tessitura massiva intercalati a paragneiss e micascisti o associati ad anfiboliti. Subordinati i feldCa-silicatici.

Paragneiss passanti minuti passanti a **micascisti** (PMA_a), a grana per lo più grossa (cfr. Unità del Mela - *Auct.*) e tessitura da orientata a scistosa; struttura porfiroblastica con blastesi statiche sulla foliazione regionale di staurolite, granato, cianite, sillimanite, cordierite, andalusite. Grossi granati relitti biancastri, destabilizzati sono ascrivibili ad un evento eclogitico. Localmente sono presenti boudins di metabasiti. Lo spessore affiorante dell'intera unità, è di circa 1000 m.
PALEOZOICO

UNITA' TETTONICA DI MANDANICI

SUCCESSIONE MESOZOICA

ARENARIE DI ROMANO (AAO)
Arenarie classiche, siltiti, marne e pelliti, di colore bruno-grigiastro, con intercalazioni di livelli di brecciole, passate a marne e calcari marnosi grigiastri, ben stratificate in livelli da centimetrici a decimetrici. Spessore poche decine di metri.
PLIENSBACHIANO - AALENIANO medio

DOLOMIE DI FIUMARA S. ANGELO (DLS)
Dolomie macrocristalline, massive o mal stratificate, di colore grigio chiaro e interessate da clivaggio diffuso. Spesore circa 50 m. L'età è desunta per probabile posizione stratigrafica.
LIAS inferiore?

VERRUCANO PELORITANO (VEP)
Conglomerati a clasti eterometrici in matrice arenitica, di colore dal rosso vinaccia al giallastro, con intercalazioni di siltiti ed argilliti rossastre, passanti verso l'alto ad arenarie grossolane di colore rosso vinaccia. Spessore circa 200 m.
TRIAS superiore - HETTANGIANO

BASAMENTO VARISICO

Metamorfiti di Mandanici con zoneografia progradà dalla facies degli scisti verdi di BMP e BT, alla facies anfibolitica di BMP e BT.

Filladi e metareniti (FDN_1): filladi grigio-scure grafitose, a grana centimetrica, grigio-verdi clortitiche, grigio-argentee sericitiche, a grana millimetrica. Subordinate, a tessitura scistosa e struttura localmente porfirica, passanti lateralmente a metareniti massive a grana fine. Alle filladi si intercalano: - quarziti a sericite, clorite ed opachi, - metabasiti, in lenti fino a metriche, a grana minuta e tessitura scistosa o scistulare, - porfiroidi, in corpi di modesta dimensione, a grana media e tessitura orientata con porfiroclasti feldspatici in matrice a sericite, clorite, biotite. I nucleotti litotipi sono caratterizzati dalla presenza di tre fasi deformative accompagnate da metamorfismo: B1, relitta; S2, foliazione principale associata a un piegamento isoclinalico che trasporta la S1; S3, clivaggio di crenulazione di piano assiale, accompagnato da blastesi di lamine decussate di clorite, mica bianca e rara biotite. Porfiroblasti di granato e clortoide cresciuti da sincinematici su S2 e post-cinematici su S3, e nei litotipi di più alto grado metamorfico staurolite statica su S3 e un ciro di oligoclasio attorno all'abite. **Marmi** (FDN_2) a grana grossa, in corpi lenticolari anche banchi, filladi e a grana minuta, comunemente a mica bianca e quarzo. Spessore fino a 700 m.
PALEOZOICO

UNITA' TETTONICA DI FONDACHELLI

SUCCESSIONE MESOZOICA

CALCARI E DOLOMIE DI SORRENTINO (SOA)
Si tratta di depositi assimilabili ai calcari e dolomie di Taormina (DOA) di cui costituiscono la litofacies con caratteristiche tipiche di piattaforma carbonatica (SOA_a). Calcari algali e calcari a dolomitici grigi e rossastri intensamente venati e spatizzati, con fantasmi di oncoliti, in banchi di spessore variabile. Spessore massimo alcune decine di metri.
LIASSICO inferiore

VERRUCANO PELORITANO (VEP)
Alternanza di arenarie quarzose in banchi metrici ed argilliti silicee rossastre in strati decimetrici. A differenti altezze stratigrafiche sono presenti livelli conglomeratici ad elementi cristallini ben arrotondati, di dimensioni centimetriche, immersi in matrice pelitica silicea di colore rosso vinaccia. Lo spessore è di circa 200 m.
TRIASSICO superiore - HETTANGIANO

BASAMENTO VARISICO

Metamorfiti di Fondachelli (FND) in facies degli scisti verdi di BT e BP.

Filladi e metareniti (FND) grigio scure, grafitose, a grana minutissima e basso grado di cristallinità, a prevalenti sericite e quarzo con subordinati clorite, albite, ossidi. Locali lamine di muscovite e cristalli di ilmenite e tormalina. Sono comuni lenti e noduli di quarzo. Metacalcari a grana minuta e strutturai grossolanissima, costituiti da prevalente calcite con minori lamine di sericite. **Quarziti** (FND_q) deformate in sistemi coniugati di pieghe chevron, mostrano sottili letti di sericite e grafite.Sono presenti tre fasi deformative la foliazione regionale (S2) corrisponde ad un clivaggio di crenulazione che trasporta una precedente foliazione (S1); pieghe chevron delle quarziti sono da attribuire ad una terza fase più giovane. Spessore massimo 500 m.
PALEOZOICO

UNITA' TETTONICA DI LONGI-TAORMINA

SUCCESSIONE MESOZOICO

SOTTOUNITÀ DI S. MARCO D'ALUNZIO

SCAGLIA (SCA)
Alternanza di marne e calcari marnosi rosai, verdi e giallastri, a frattura concoide in strati da 10 a 20 cm, cui si addizionano calcareniti gradate e brecciole e, verso l'alto siltiti gialliastre. Alla base sono presenti faune a *Planomalina buxtorfi*, *Rotalipora balernensis*, *Rotalipora cfr. appenninica*, *Rotalipora praeappenninica*, localmente, a tetto, brecce carbonatiche ad elementi di 2-20 cm in una matrice contenente *Nummulites* sp., *Discocyclina* sp., *Asterocyclina* sp., *Actinocyclina* sp., *Rotalia* sp., Spessore massimo 100 m.
CP3 inferiore p.p.- EOCENE medio???

ROSSO DI SAN MARCO (RMA)
Calcari algali grigi, calcari dolomitici, calcari a peloidi ricchi in grani di quarzo, passanti a calcari encrinitici rosai, seguiti da calcari a brachiopodi e ammoniti, verrati e spatizzati, in banchi di spessore variabile separati da discontinue croste polimetalliche (*hard-ground*). Macrofaune a *Spiriferina rostrata*, *Nucleata aspasia*, *Juraphyllites* spp. e *Tropidoceras* spp. Microfaune a *Siphovalvulina* sp., *Agerina martana*, oltre ad alghe quale *Cayeuxia* sp. Ove presente, la parte alta della formazione è rappresentata da calcari rosastri cariellitici e da un accumulo condensato di posidonioli cui a luoghi seguono calcari finemente detritici, contenenti piccole ammoniti, belemniti, echinodermi e foraminiferi planctonici, oltre a microfacies contenenti abbondante *Saccocoma*. Spessore massimo 60 m.
PLIENSBACHIANO - TITONICO inferiore

VERRUCANO PELORITANO (VEP)
Alternanza di quarzareniti rossastre in banchi metrici ed argilliti silicee rossastre in strati decimetrici. Lo spessore non è superiore a 10 m.
TRIASSICO superiore - HETTANGIANO

SOTTOUNITÀ DI M. SAN PIETRO

SCAGLIA (SCA)
Calcari marnosi e marne di colore rosso, verde e giallastro. I calcari sono dati da biomicriti più o meno marnose ricche di foraminiferi planctonici con tessitura fluidale, talora con sottili intercalazioni silicoclastiche, o da calcareniti fini intraclastiche, gradate. Verso l'alto sono sempre più presenti intercalazioni di siltiti gialliastre (per le faune confronta sottounità Longi). A luoghi sono state rinvenute impronte di *Inocerami*. Lo spessore è variabile, massimo poche decine di metri.
CRETACICO superiore - EOCENE medio

MAIOLICA (MAI)
Calcilutiti grigio biancastre e calcari marnosi bianchi a frattura concoide con noduli e lenti di selce nera, in strati medio-sottili alternati a giunti argillosi. Contengono aptici, belemniti e rari resti di ammoniti. Associazioni microfaunistiche con *Globuligerina bathoniana*, *Globuligerina oxfordiana*, *G. cerpatica e Remaniella calpionelle* in quelle superiore. Associazioni a nannofossili con *Nannoconus steinmanni*, *Nannoconus* spp., *Braarudosphaera bigelowii*, *Cruciellipsis cuvillieri*, *Stradneria crenulata*, *Micrantholithus hoschulzii*, *M. obtusus*. Affiorano in lembi discontinui o come blocchi isolati. Spessore da pochi metri fino a 100 m.
TITONICO - APTIANO

ROSSO AMMONITICO (*cfr.* **"Rosso Ammonitico Inferiore"** *Auct. p.p.* e **"Rosso Ammonitico Superiore"** *Auct. p.p.*)
Con questo termine viene indicata una successione irregolare e discontinua, che comprende anche termini non appartenenti alla formazione valdata dalla CIS. Si tratta di argille e marne seguite da calcari marnosi rosai ("Rosso Ammonitico Inferiore" *Auct.*) con *Hildoceras* sp., Collina sp. e *Posidonia*; Radiolariti, calcari silicei e diaspri a *Cenosphaera* sp. e *Sethocapsa* sp. Calcari marnosi nodulari ("Rosso Ammonitico Superiore" *Auct.*) a lamellibranchi pelagici, ammoniti ed Aptici, contenenti *Saccocoma* sp. Lembi non cartografabili di questa successione affiorano insieme alla Maiolica alla base della Scaglia. Spessore complessivo non superiore a 20 m.
TOARCIANO - TITONICO p.p.

GRUPPO DEL MEDOLO (MD)
Alternanza di calcari marnosi e marne grigio-verdastre con liste e noduli di selce. Nella parte inferiore sono presenti spongoliti con finissimo silt quarzitico e con rari fantasmi di foraminiferi bentonici, e verso l'alto micriti debolmente arenacee con radiolari, foraminiferi, rari ostracodi, rari brachiopodi, gasteropodi e ammoniti. Spessore massimo 200 m.
PLIENSBACHIANO p.p.

Triassico superiore

CALCARE E DOLOMIE DI TAORMINA (DOA)
Calcari dolomitici bianco-grigiastri, massivi o stratificati in grossi banchi, passanti lateralmente a dolomie saccaroidi gialliastre. I livelli più alti della successione sono detritici, con abbondanti clasti di quarzo, e contengono *Agerina martana*. Il contorno macrofaunistico è dato da scarsi frammenti di ammoniti, lamellibranchi e gasteropodi non classificabili. Spessore massimo 170 m.
NORIANO-RAETICO/HETTANGIANO

VERRUCANO PELORITANO (VEP)
Arenarie quarzose rosse o giallastre in grossi banchi alternati a sottili intercalazioni siltose rosse, fino a passare a conglomerati ad elementi centimetrici quarzosi e metamorfici ben arrotondati. Contengono pollini e frustoli carboniosi e verso l'alto lamellibranchi (*Pleuromya striatula* e *Cyprichardia pomecta*) ed impronte di *Pinna hartmanni*. Spessore variabile fino ad una decina di metri.
TRIASSICO superiore - HETTANGIANO

SOTTOUNITÀ DI LONGI

FLYSCH DI FRAZZANO' (FRZ, FRZa, FRZb)
Alternanza arenaceo-pelitico-conglomeratica caratterizzata da litofacies arenitiche alla base (FRZ_a) evolvente rapidamente a litofacies arenitico-conglomeratiche ed infine esclusivamente conglomeratiche nei livelli apicali (FRZ_b). La arenitiche, variano da litareniti feldspatiche nei livelli basali, ad arcose litiche ben ad arcose in quelli medio-alti; in strati a granulometria medio-grossolana, gradati e laminati, alternati a sottili livelli pelitici. La litofacies conglomeratica è costituita da grossi banchi lenticolari con base erosiva. La composizione dei ciottoli è data da prevalenti elementi metamorfici di grado intermedio ed alto e da rocce granitoidi, a subordinatamente da clasti carbonatici e/o arenitici. In assenza di microfaune significative l'età viene definita dal rapporto stratigrafico con la sottostante metabasiti, con anfiboliti prevalenti.
EOCENE medio- superiore - OLIGOCENE

SCAGLIA (SCA)
Calcari marnosi e marne di colore rosso, verde e giallastro, ricche di foraminiferi planctonici con tessitura fluidale, talora con sottili intercalazioni silicoclastiche e calcareniti fini intraclastiche. Verso l'alto le marne si arricchiscono gradualmente in livelli arenitici gialliastri, gradati, spessi da 5 a 50 cm, fino a dare luogo ad un'alternanza arenaceo-argillosa di transizione al flysch di Frazzanò. Microfaune a *Contusotruncana contusa*, *C. pilcata*, *Globotruncanita stuarti*, *G. stuartiformis*, *Globotruncanella petaloidea*, *Gansserina* sp. e *Racemiguembelina fructosa*; varisenti i bentonici tra cui *Marssonella oxicona*, *Tritaxia* sp. e *Ammodiscus cretaceous*. Nei livelli più alti microfaune a *Morozovella cf. rex*. Nannoflore scarse caratterizzate da Watznaueria barnesae e *Micula decussata*. Lo spessore non dovrebbe superare i 200 m.
CRETACICO superiore - EOCENE medio

MAIOLICA (MAI)
Calcilutiti grigio-biancastre e calcari marnosi bianchi con noduli e lenti di selice nera, in strati medio-sottili alternati a giunti argillosi. Contengono aptici, belemniti e rari resti di ammoniti. Associazioni microfaunistiche con *Globuligerina bathoniana*, *Globuligerina oxfordiana*, *G. cerpatica e Remaniella calpionelle* in quelle superiore. Associazioni a nannofossili con *Nannoconus steinmanni*, *Nannoconus* spp., *Braarudosphaera bigelowii*, *Cruciellipsis cuvillieri*, *Stradneria crenulata*, *Micrantholithus hoschulzii*, *M. obtusus*. Affiorano in lembi discontinui o come blocchi isolati. Spessore da pochi metri fino a 100 m.
TITONICO - APTIANO

GRUPPO DEL MEDOLO (MD, MDa, MDb)
Alternanza di calcari marnosi e marne grigio-verdastre con liste e noduli di selce. Nella parte inferiore sono presenti spongoliti con finissimo silt quarzitico e con rari fantasmi di foraminiferi bentonici, e verso l'alto micriti debolmente arenacee con radiolari, foraminiferi, rari ostracodi, rari brachiopodi, gasteropodi e ammoniti. Spessore massimo 200 m.
PLIENSBACHIANO p.p.

Giurassico superiore - Cretac