Servizio Geologico d'Italia (2013) - *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, F. 619 S. Margherita di Belice*. ISPRA, Roma.
DOI: 10.15161/oar.it/143313

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Opera Cartografica della Legge 68 del 2.2.1960

Regione Siciliana
Assessorato Territorio Ambiente

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Dal rilevamento geologico 1:10.000

SANTA MARGHERITA DI BELICE
FOGLIO 619

dalla Carta 1:50.000 dell'I.G.M.

RESPONSABILE DEL PROGETTO PER LA REGIONE SICILIA: G. Arnone[1]
RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FOGLIO: D. Grasso[1], R. Giordano[1]
COORDINATORE SCIENTIFICO: P. Di Stefano[2]
GEOLOGIA STRUTTURALE: P. Rendi[2], F. Nigro[2]
ANALISI BIOSTRATIGRAFICHE: E. Di Stefano[2], R. Sprovieri[2], S. Bonomo[2], M. S. Cacciante[2]
GEOMORFOLOGIA: S. Monteleone[2], M. Sabatino[2]

1) Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente
2) Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare - Università di Palermo

SUDDIVISIONE DEI RILEVAMENTI GEOLOGICI ALLA SCALA 1:10.000
RILEVATORE: P. Di Stefano (a), P. Rendi (b), G. Zarcone (c), G. Bilello (d), F. Nigro (e), M. S. Cacciante (f), D. Strazzulla (g), F. Torre (h), A. Torre (i), S. Monteleone (l), M. Sabatino (m).
DIRETTORI DEL RILEVAMENTO: P. Di Stefano[2], P. Rendi[2], G. Zarcone[2].

DEPOSITI QUATERNARI

L'unità non distinte in base al bacino di appartenenza

Deposito di frana
a_t Accumuli gravitativi caotici di materiali eterogenei ed eterometrici con e senza evidenze di movimenti in atto.
OLOCENE

Detrito di falda
a_t Materiale eterometrico caratterizzato dalla presenza di blocchi angolosi di varia natura accumulati per gravità alla base di pareti di rocce affioranti.
OLOCENE

Depositi alluvionali in evoluzione
b_2 Ghiaie, sabbie, limi e silt accumulati lungo le principali aste fluviali o torrentizie, soggette ad evoluzione degli ordinari processi fluviali.
OLOCENE

Depositi eluvio-colluviali
b_1 Coperture detritiche dovute ad alterazione "in situ" o, depositi mobilizzati da processi di ruscellamento, costituiti da clasti eterometrici di varia litologia in matrice pelitica e/o sabbiosa.
PLEISTOCENE SUPERIORE-OLOCENE

Depositi palustri e lacustri
l Limi e limi sabbiosi nerastri con ciottoli poligenici e abbondante frazione organica nei livelli pelitici.
PLEISTOCENE SUPERIORE-OLOCENE

Travertino
Depositi fitoclastici e fitoermali e, localmente, travertini stromatolitici.
PLEISTOCENE SUPERIORE-OLOCENE

Depositi di origine mista di debris flow e torrentizio
Orbconglomerati e paraconglomerati con clasti ben arrotondati di prevalente natura calcarea, con matrice sinetitico-siltosa.
PLEISTOCENE

SINTEMA DEL FIUME VERDURA
Depositi alluvionali del bacino Sosio-Verdura costituiti da conglomerati, ghiaie e sabbie più o meno cementate, con tenori variabili di matrice limoso-argillosa.
PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE
SVD_3 **subintema Valentino** (SVD_3): ghiaie mal classate e con scarso arrotondamento, con matrice argilloso-sabbiosa di colore bruno rossastro, che ricoprono i depositi più antichi terrazzati. Questi depositi bordano l'attuale corso del Fiume Verdura e si estendono, a Sud, in località S. Agata.
SVD_2 **subintema Mandile** (SVD_2): orbconglomerati con ciottoli di calcari mesozoici e matrice limoso-sabbiosa di colore bruno-rossastro, sviluppati a quote intorno ai 200 m.
SVD_1 **subintema San Carlo** (SVD_1): conglomerati grossolani, poligenici, eterometrici, generalmente mal classati, con scarsa matrice argilloso-arenacea. Si alternano in alcuni casi a livelli di sabbie argillose. Colore prevalentemente bianco-rosato. L'appoggio inconforme è sui terreni pliocenici di Burgio. Lo spessore raggiunge gli 80 m.

SINTEMA DEL FIUME CARBOJ
Depositi alluvionali costituiti prevalentemente da conglomerati, ghiaie e sabbie limo-argillose con occasionali livelli. Questi depositi originano una serie di terrazzi a Nord del Lago Arancio ed alla base del versante settentrionale di Pizzo Telegrafo (spessori fino ad una decina di metri).
SC_3 *PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE*
SC_2 **subintema Ponte Carboj** (SC_2): conglomerati ben arrotondati con ciottoli prevalenti di calcari mesozoici, associati a ghiaie e limi bruno-rossastri. Originano la conoide alluvionale allo sbocco della fiona di Stretta Arancio.
SC_1 **subintema Castellazzo** (SC_1): orbconglomerati con matrice limo-argillosa con, intercalati, livelli di sabbie limose e limi. Si trovano a quote di circa 200 m al margine settentrionale del Lago Arancio.
subintema Casa Saporito (SC_1): conglomerati con matrice sabbioso-pelitica, coperti da ciotti sabbioso-limose pedogenizzate, posti a quote di circa 250 m principalmente lungo i valloni Gulfotta e Guarricello. Limite inferiore inconforme su BLC.

SINTEMA DEL FIUME BELICE
Conglomerati poligenici, ghiaie e sabbie localmente cementati, con tenori variabili di matrice e materiale fine, in genere ricoperti da una coltre limoso-argillosa pedogenizzata. Spessore fino a circa 15 m.
SBE_3 *PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE*
SBE_2 **subintema Piano del Campo** (SBE_2): depositi ghiaiosi e ciottolosi, passanti verso l'alto a sabbie e limi pedogenizzati presenti lungo le sponde delle valle fluviali del Fiume Belice, Torrente Senore e Torrente Realbate.
SBE_1 **subintema Torrazza** (SBE_1): ghiaie, sabbie e sabbie limose con occasionali blocchi. Originano lembi isolati, frequenti lungo il corso dei torrenti Senore e Balicasino.
subintema Cozzo Rimbeve (SBE_1): ghiaie in sabbie poggianti con limite inconforme sui terreni tortoniani. Affiorano lungo l'alveo del Torrente Batticano. Il limite superiore è una superficie pedogenizzata.

DEPOSITI QUATERNARI MARINI

SINTEMA DI MARSALA
MRS_2 Bioclastareniti e molluschi alternate a bioclastruditi in spessi banchi. Presenza di intercalazioni di marne e di livelli conglomeratici e sabbiosi (MRS$_1$). Lateralmente questi depositi passano ad argille siltose a foraminiferi planctonici ed *Truncatulinoides excelsa* (MRS$_2$). Spessore 20-50 m.
EMILIANO p.p. - SICILIANO

FORMAZIONE AGRIGENTO
AGG_1 Sublitareniti, bioclastareniti e bioclastruditi contenenti ricche associazioni a molluschi (AGG), passanti lateralmente e verticalmente a peliti brune con tenori variabili di sabbie quarzoso carbonatiche (AGL$_1$). Nel settore di Burgio presenza, nella porzione superiore, di intercalazioni conglomeratiche e sabbie quarzose sterili con laminazione obliqua (AGG$_1$). Spessore da 30 a 60 m fino a 600 m nel settore di Burgio.
SANTERNIANO

DEPOSITI SIN-TARDOROGENI

FORMAZIONE MARNOSO ARENACEA DEL BELICE
BLC Argille ed argille marnose grigio-azzurre con foraminiferi planctonici; presenza di spesse intercalazioni di arenarie fini/e torbiditiche nella porzione inferiore (BLC$_4$, spessore massimo 200 m, ambiente torbiditico) e, nella porzione medio-superiore di intercalazioni di bioclastareniti e bioclastruditi a molluschi (BLC$_3$, spessori fino a 50 m, ambiente costiero). Nel settore di Portella Misilbesi presenza di calcareniti ad *Amphistegina* (BLC$_2$, spessore circa 50 m, ambiente di piattaforma carbonatica) in banchi in genere cinostratificati.
BLC$_4$
BLC$_3$
BLC$_2$
PIACENZIANO - GELASIANO

TRUBI
TRB$_2$ Marne e calcari marnosi bianchi a foraminiferi planctonici (Biozone da MPI 1 a MPI 4b) contenenti localmente corpi di megabrecce con litoclasti carbonatici triassico-miocenici (TRB$_1$). Spessore 40-50 m. Ambiente pelagico. Limite inferiore discordante.
TRB$_1$
TRB
ZANCLEANO - PIACENZIANO INFERIORE

GRUPPO GESSOSO-SOLFIFERA

FORMAZIONE DI PASQUASIA
GPQ$_2$ **membro dei calcari a congerie** (GPQ$_2$): calcari bianchi marnosi con ostracodi e gasteropodi di piccole dimensioni (*Ritiodoli*), con locali intercalazioni di calciruditi grossolane, con clasti angolosi di marne calcaree. Limite discordante su termini sottostanti. Spessore massimo circa 25 m.
MESSINIANO

FORMAZIONE DI CATTOLICA
GTL$_2$ **membro selenitico** (GTL$_2$): gessi selenitici stratificati in banchi di 1-3 m di spessore, alternati a laminiti gessose (GTL$_1$). Spessore 30-100 m. Lateralmente i banchi di gesso selenitico passano a gessi alabastrini (GTL$_2$).
GTL$_1$
MESSINIANO

FORMAZIONE CIMINNA
CS$_2$ **membro pelitico** (CS$_2$): marne e marne sabbiose brune con microfaune marine a foraminiferi (*Turborotalita multiloba, Bulimina echinata, Neogloboquadrina acostaensis* dx). Spessore massimo fino a 50 m.
MESSINIANO INFERIORE
CS$_1$ **membro gessoso** (CS$_1$): marne tripolacee biancastre, passanti verso l'alto a torbiditi gessose costituite da gessareniti laminate con occasionali intervalli di gessoruditi con litoclasti di carbonati mesozoici. Presenza di lenti di gessi selenitici secondari e gessi alabastrini. Verso l'alto si osservano livelli di calcari travertinoidi, vacuolari (ben esposti nella sezione di Costiere). Spessore fino a 60 m. Ambiente evaporitico.
MESSINIANO INFERIORE

FORMAZIONE BAUCINA
BAU Calcareniti bioclastiche bianco-giallastre con frammenti di lamellibranchi e stratificazione poco definita. Spessore massimo 5 m. Ambiente di piana deltizia.
MESSINIANO INFERIORE

FORMAZIONE TERRAVECCHIA
Argille, argille sabbiose e marne brune con foraminiferi planctonici passanti lateralmente a sabbie ed arenarie da giallastre a grige. Presenza di lenti conglomeratiche con matrice sabbiosa nella porzione inferiore (spessori fino a 600 m). Limite inferiore discordante sui terreni più antichi.
TORTONIANO SUPERIORE - MESSINIANO INFERIORE
TRV$_3$ **membro pelitico** (TRV$_3$): marne e marne argillose con tenori variabili di sabbie prevalentemente quarzose (spessore fino a 450 m) contenenti foraminiferi planctonici delle biozone a *Globigerinoides obliquus extremus, Globorotalia suterae, Globorotalia conomiozea* passanti verso l'alto a marne e marne sabbiose brune a foraminiferi (*Turborotalita multiloba, Bulimina echinata, Neogloboquadrina acostaensis* dx.). Ambiente di piattaforma aperta.
TRV$_2$ **membro sabbioso** (TRV$_2$): sabbie quarzose da brune giallastre a rossastre, in genere incoerenti o debolmente cementate, cui si alternano, in rari casi, banchi di arenarie quarzose e sottili livelli conglomeratici con ciottoli appiattiti embricati. Spessore 150-200 m. Ambiente deltizio e marino prossimale.
TRV$_1$ **membro conglomeratico** (TRV$_1$): paraconglomerati ed ortoconglomerati poligenici con elementi mesozoici molto arrotondati, con tenori variabili di matrice sabbioso-argillosa di colore bruno-giallastro. Spessore 50 m. Ambiente di piana alluvionale.







Copyright by ISPRA- Servizio geologico d'Italia - 2013

Da fot dell'Istituto Geografico Militare (Autorizzazione IGM n. 4791 del 04/05/98)
Carta Ufficiale dello Stato, tutti i diritti di riproduzione e di rielaborazione riservati
(Legge n. 68 del 2.2.1960)

Progetto CARG: Legge 226/99

Direttore Responsabile: C. Campobasso





Stampa: SYSTEMCART Srl, Roma - 2013

Foglio con nota illustrativa

Banca dati ed allestimento cartografico digitale: Consorzio Ticonzero, Palermo

SUCCESSIONE DEL BACINO SICANO

MARNE DI SAN CIPRELLO
CIP Marne grigio-azzurrognole contenenti modesti tenori di sabbie quarzose che tendono ad aumentare verso l'alto. Presenza di foraminiferi planctonici delle biozone da *Orbulina suturalis/Paraglobotalia pseudobarmeri* (MMI 5) a *Neogloboquadrina acostaensis* (MMI 11) e di nannofossili calcarei delle biozone da MNN 5b a MNN 9. Spessori che superano i 200 m. Ambiente deposizionale piattaforma esterna. Limite inferiore graduale.
LANGHIANO SUPERIORE - TORTONIANO INFERIORE

CALCARENITI DI CORLEONE
CCR Biocalcareniti ed arenarie quarzoso-glauconitiche con tenori variabili di bioclasti carbonatici, alternate a marne e marne sabbiose bruno-verdastre contenenti foraminiferi planctonici indicativi, nella porzione inferiore, della biozona a *Globoquadrina dehiscens dehiscens* e, nella porzione superiore, della biozona a *Praeorbulina glomerosa* s.l. Spessori 10-80 m. Ambiente deposizionale deltizio. Limite inferiore paraconforme su RDE.
AQUITANIANO SUPERIORE - LANGHIANO INFERIORE

FORMAZIONE RAGUSA
RAG$_1$ **membro Irminia** (RAG$_1$): calcareniti bioclastiche di colore variabile dal bianco al giallastro in banchi di spessore metrico, contenenti lepidocicline, rare miogypsine, melobesie e frammenti di echinoidi. Affiorano nei dintorni di Burgio con spessori di 20-50 m. Ambiente di piattaforma carbonatica. Limite discordante sui terreni sottostanti.
MIOCENE INFERIORE
RAG$_2$ **membro Leonardo** (RAG$_2$): calcari marnosi biancastri, in spessi banchi che si alternano a marne bianche o grigiastre. Presenza di intercalazioni di bioclastareniti rummulitiche e bioclastruditi risedimentate. Spessore fino a 60 m. Ambiente emipelagico. Limite discordante sui terreni sottostanti.
OLIGOCENE MEDIO-SUPERIORE

FORMAZIONE AMERILLO
AMM$_2$ Calciruditi biancastre a volte rosate, con liste e noduli di selce alternate a calciruditi marnose e marne con foraminiferi planctonici. Intercalazioni di megabrecce carbonatiche, costituite prevalentemente da clasti di piattaforma carbonatica ed in subordine da pelagiti (AMM$_1$). Spessori 100-200 m. Ambiente di scarpata e pelagico. Limite inferiore paraconforme sulle unità sottostanti.
AMM$_1$
CRETACICO SUPERIORE - EOCENE

FORMAZIONE HYBLA
HYB Marne ed argille marnose a calciruditi selcifere con radiolari e foraminiferi (*Lingulina tribobitomorfa, Rotaliporo ticinensis, Ticinella roberti, Biticinella breggiensis*). Presenza di intercalazioni metriche di marne grigio scure ricche in sostanza organica. Spessore variabile da 0 a 50 m. Ambiente emipelagico. Limite inferiore concordante sulla sottostante unità.
HAUTERIVIANO - ALBIANO

LATTIMUSA
LTM Calciruditi biancastre a volte rosate, con liste e noduli di selce e sottili intercalazioni di marne grigio-verdastre contenenti radiolari e calpionelle. Spessore circa 50 m. Ambiente pelagico. Limite inferiore concordante su BUU.
TITONIANO SUPERIORE - VALANGINIANO

FORMAZIONE BARRACÙ
BUU Calciruditi selcifere alternate a sottili livelli di marne siliciziate a radiolari e selci stratificate. Presenza di livelli decimetrici di calciruditi con litoclasti di piattaforma carbonatica. Spessore da 20 a 50 m. Presenza di radiolari, di nannofossili (*Watznaueria barnesae* associata a *Discorhabdus*) e di Saccocoma sp. nella porzione superiore. Ambiente di pendio deposizionale-bacino. Limite inferiore brusco su basalti e sulle calciruditi della BOO.
BAJOCIANO INFERIORE - TITONIANO INFERIORE

CALCARI DI S. MARIA DEL BOSCO
BOO Calciruditi pelagiche biancastre, a volte avana, a luoghi rosate e nodulari, in strati centimetrici e decimetrici, con intercalazioni di marne grige o verdastre con ammoniti, foraminiferi (*Paraglungulina gr. lenera, Marginulina prima, Globuspirillina* sp., *Lenticulina* sp., lagenidi, protoglobigerinidi) nella porzione sommitale). Nannofossili delle zone NJT 4 (*S. cruciulus*) ed NJT 5 (*L. fasciffi*); spessore da 80 a 100 m. Presenza di rari banchi di calciruditi con elementi derivanti da carbonati di piattaforma del Triassico Superiore-Giurassico Inferiore. Nella porzione superiore o al passaggio fra questa unità e la soprastante formazione Barracù sono presenti intercalazioni di lave basaltiche a pillow e laboidi con spessore massimo di 100 metri (BOO$_2$). Ambiente di scarpata deposizionale-bacino. Limite inferiore continuo sulle calcareniti oolitiche GUD.
PLIENSBACHIANO SUPERIORE - BAJOCIANO INFERIORE

CALCARI OOLITICI DI MONTE GENUARDO
GUD Calcareniti torbiditiche oolitico-bioclastiche, di colore bianco, in alcuni casi grigio o nocciola alternate a calciruditi a radiolari. Oltre ad oodi contengono bioliti intraclasti microlitici ed abbondante materiale bioclastico rappresentato da alghe calcaree, foraminiferi, molluschi, ed echinodermi. Presenza, alla base, di banchi di calciruditi e calcareniti gradate, con litoclasti derivanti da depositi di scogliera (conoclo-ritici) (GUD$_2$), spessore fino a 40 m). I livelli sommitali sono caratterizzati spesso da encriniti grige o rossastre con ricche associazioni a brachiopodi. Spessore complessivo tra 20 e 100 m circa. Ambiente di scarpata-bacino prossimale. Limite inferiore erosivo su SCT.
RETICO SUPERIORE - PLIENSBACHIANO SUPERIORE

FORMAZIONE SCILATO
SCI Calciruditi grige con liste e noduli di selce contenenti lamellibranchi pelagici (halobidi), radiolari, calcisfere, conodonti. Intercalazioni di sottili livelli di marne brune e, verso l'alto di calcareniti bioclastiche torbiditiche. Spessore massimo 450 m. Ambiente di scarpata distale e pelagico. Limite inferiore graduale su MUF.
CARNICO SUPERIORE - RETICO INFERIORE

FORMAZIONE MUFARA
MUF Calciruditi grigio scure, a luoghi dolomitizzate, alternate a marne bruno-giallastre con lamellibranchi pelagici (halobidi). Presenza di lave basaltiche a pillow molto alterate (MUF$_2$). Spessore 50-100 m. Ambiente emipelagico.
MUF$_2$
CARNICO MEDIO - SUPERIORE

COMPLESSO DI LERCARA
LER Argille rosse con frammenti bioclastici di arenarie torbiditiche quarzoso-micacee contenenti tenori variabili di grani carbonatici in parte bioclastici con ostracodi, conodonti e foraminiferi bentonici. Spessore non valutabile. Ambiente di scarpata deposizionale.
PERMIANO SUPERIORE

SUCCESSIONE DI TRANSIZIONE FRA PIATTAFORMA CARBONATICA SACCENSE E BACINO SICANO

MARNE DI SAN CIPRELLO
CIP Marne bianche passanti verso l'alto a marne grigio-azzurrognole contenenti modesti tenori di sabbie quarzose che tendono ad aumentare verso l'alto. Presenza di foraminiferi planctonici delle biozone a *Orbulina suturalis/Paraglobotalia pseudobarmeri* MMI 5 a *P. siakensis* MMI 9, rare concentrazioni di gusci di *Aluria aluri*. Spessori 100-200 m. Ambiente di piattaforma aperta, limite inferiore graduale su CCR, localmente discordante su RDE.
LANGHIANO SUPERIORE - TORTONIANO INFERIORE

CALCARENITI DI CORLEONE
CCR Biocalcareniti ed arenarie quarzoso-glauconitiche con tenori variabili di bioclasti carbonatici, alternate a marne e marne sabbiose bruno-verdastre contenenti foraminiferi planctonici indicativi, nella porzione inferiore, della biozona a *Globoquadrina dehiscens dehiscens* e, nella porzione superiore, della biozona a *Praeorbulina glomerosa* s.l. Spessori 10-80 m. Ambiente deposizionale deltizio. Limite inferiore paraconforme su RDE.
AQUITANIANO SUPERIORE - LANGHIANO INFERIORE

MARNE DI CARDELLIA
RDE Marne sabbiose grigio-verdastre, talora rossastre a foraminiferi planctonici (globigerinidi, globorotalidi) ed abbondanti ictiofossili passanti verso l'alto a marne sabbiose grige con *Globorotalia opima opima, Gl. angulisuturalis* e *Gl. kugleri* spessore circa 100 m. Presenza, nella porzione mediana, di rudtti ed areniti fotdo calcareo-quarzoso-glauconitiche con stratificazione incrociata (spessore fino a 20 m), con *Lepidocyclina* sp. ed alghe rosse (RDE$_2$). Ambiente di piattaforma aperta-scarpata deposizionale. Limite inferiore paraconforme su AMM.
OLIGOCENE SUPERIORE - AQUITANIANO INFERIORE

FORMAZIONE AMERILLO
AMM$_2$ Calciruditi biancastre a volte rosate, con liste e noduli di selce alternate a calciruditi marnose e marne con foraminiferi planctonici. Intercalazioni di megabrecce carbonatiche, costituite prevalentemente da clasti di piattaforma carbonatica ed in subordine di pelagiti (AMM$_1$). Spessori 100-200 m. Ambiente di scarpata e pelagico. Limite inferiore paraconforme sulle unità sottostanti.
AMM$_1$
CRETACICO SUPERIORE - EOCENE

FORMAZIONE HYBLA
HYB Marne ed argille marnose a calciruditi selcifere con radiolari e foraminiferi (*Lingulina tribobitomorfa, Rotaliporo ticinensis, Ticinella roberti, Biticinella breggiensis*). Presenza di intercalazioni metriche di marne grigio scure ricche in sostanza organica. Spessore variabile da 0 a 50 m. Ambiente emipelagico. Limite inferiore concordante sulla sottostante unità.
HAUTERIVIANO - ALBIANO

LATTIMUSA
LTM Calciruditi biancastre a volte rosate, con liste e noduli di selce e sottili intercalazioni di marne grigio-verdastre contenenti radiolari e calpionelle (*Tintinnopsella carpathica, Calpionella alpina, Remanella Remanella, Calpionella elliptica*). Spessore circa 50 m. Ambiente pelagico. Limite inferiore graduale su BUU.
TITONIANO SUPERIORE - VALANGINIANO

FORMAZIONE BARRACÙ
BUU Calciruditi selcifere alternate a sottili livelli di marne siliciziate a radiolari e selci stratificate. Presenza di livelli decimetrici di calciruditi con litoclasti di piattaforma carbonatica. Spessore da 20 a 50 m. Presenza di radiolari, di nannofossili (*Watznaueria barnesae* associata a *Discorhabdus*) e di Saccocoma sp. nella porzione superiore. Ambiente di pendio deposizionale-bacino. Limite inferiore brusco su basalti e sulle calciruditi della BOO.
BAJOCIANO INFERIORE - TITONIANO INFERIORE

CALCARI DI S. MARIA DEL BOSCO
BOO Calciruditi pelagiche biancastre, a volte avana, a luoghi rosate e nodulari, in strati centimetrici e decimetrici, con intercalazioni di marne grige o verdastre con ammoniti, foraminiferi (*Paraglungulina gr. lenera, Marginulina prima, Globuspirillina* sp., *Lenticulina* sp., lagenidi, protoglobigerinidi) nella porzione sommitale). Nannofossili delle zone NJT 4 (*S. cruciulus*) ed NJT 5 (*L. fasciffi*); spessore da 80 a 100 m. Presenza di rari banchi di calciruditi con elementi derivanti da carbonati di piattaforma del Triassico Superiore-Giurassico Inferiore. Nella porzione superiore o al passaggio fra questa unità e la soprastante formazione Barracù sono presenti intercalazioni di lave basaltiche a pillow e laboidi con spessore massimo di 100 metri (BOO$_2$). Ambiente di scarpata deposizionale-bacino. Limite inferiore continuo sulle calcareniti oolitiche GUD.
PLIENSBACHIANO SUPERIORE - BAJOCIANO INFERIORE

CALCARI OOLITICI DI MONTE GENUARDO
GUD Calcareniti torbiditiche oolitico-bioclastiche di colore bianco, alternate a sottili livelli di calciruditi a radiolari. Il materiale bioclastico è rappresentato da alghe calcaree, foraminiferi, molluschi, ed echinodermi. Spessore complessivo 80 m. Ambiente di pendio deposizionale. Limite inferiore discordante su CZP.
HETTANGIANO - PLIENSBACHIANO INFERIORE

FORMAZIONE COZZO DI LUPO
CZP$_2$ Dolomie e calcari dolomitici biancastri, massivi, costituiti prevalentemente da bioliti e breccie con spugne, rari coralli e foraminiferi (*Galeanella pantcae, Galeanella laticarinata, Siculocosta battaglerisis*). Questi depositi passano lateralmente e verso l'alto a dolomie bianco grigiastre, vacuolari, in banchi piani paralleli di spessore metrico (CZP$_1$). Spessore affiorante circa 200 m. Ambiente di scogliera, avanscogliera e scarpata. Limite inferiore non affiorante.
CZP$_1$
CZP
NORICO - RETICO

SUCCESSIONE DELLA PIATTAFORMA CARBONATICA SACCENSE

MARNE DI SAN CIPRELLO
CIP Marne grigio-brune debolmente sabbiose con foraminiferi planctonici della biozona a *Paraglobotalia siakensis*. Spessore 30 m. Ambiente di piattaforma aperta. Limite inferiore discordante sul substrato mesozoico.
TORTONIANO INFERIORE

CALCARENITI DI CORLEONE
CCR Biocalcareniti ed arenarie quarzoso-glauconitiche con tenori variabili di bioclasti carbonatici, alternate a marne e marne sabbiose bruno-verdastre contenenti nannofossili calcarei e foraminiferi planctonici (biozone a *Globigerinoides trilobus, Praeorbulina glomerosa* s.l.). Spessori non superiori a 30 m. Ambiente deltizio. Limite inferiore discordante sul substrato mesozoico.
BURDIGALIANO SUPERIORE - LANGHIANO INFERIORE

FORMAZIONE RAGUSA
RAG$_1$ **membro Irminia** (RAG$_1$): calcareniti di colore variabile dal bianco al giallastro fino al grigiastro in banchi di spessore metrico. Sono presenti lepidocicline, rare miogypsine, melobesie e articoli e piastrine di crinoidi. Inoltre sono spesso presenti pectinidi ed echinidi. Lo spessore massimo nell'area è di circa 20-50 m. Ambiente di piattaforma carbonatica. Limite discordante sui terreni sottostanti.
MIOCENE INFERIORE
RAG$_2$ **membro Leonardo** (RAG$_2$): calcari marnosi biancastri, in spessi banchi che si alternano a marne bianche o grigiastre. Presenza di intercalazioni di bioclastareniti rummulitiche e bioclastruditi risedimentate. Spessore fino a 60 m. Ambiente emipelagico. Limite discordante sui terreni sottostanti.
OLIGOCENE MEDIO-SUPERIORE

FORMAZIONE AMERILLO
AMM$_2$ Calciruditi biancastre a volte rosate, con liste e noduli di selce alternate a calciruditi marnose e marne con foraminiferi planctonici. Intercalazioni di megabrecce carbonatiche, costituite prevalentemente da clasti di piattaforma carbonatica ed in subordine di pelagiti (AMM$_1$). Spessori 100-200 m. Ambiente di scarpata e pelagico. Limite inferiore paraconforme sulle unità sottostanti.
AMM$_1$
CRETACICO SUPERIORE - EOCENE

FORMAZIONE HYBLA
HYB Marne ed argille a calciruditi selcifere con radiolari e foraminiferi (*Lingulina tribobitomorfa, Rotaliporo ticinensis, Ticinella roberti, Biticinella breggiensis*). Presenza di intercalazioni metriche di marne grigio scure ricche in sostanza organica. Spessore variabile da 0 a 50 m. Ambiente emipelagico. Limite inferiore concordante sulla sottostante unità.
HAUTERIVIANO - ALBIANO

LATTIMUSA
LTM Calciruditi biancastre a volte rosate, con liste e noduli di selce e sottili intercalazioni di marne grigio-verdastre contenenti radiolari e calpionelle (*Tintinnopsella carpathica, Calpionella alpina, Remanella Remanella, Calpionella elliptica*). Spessore circa 50 m. Ambiente pelagico. Limite inferiore graduale su BUU.
TITONIANO SUPERIORE - VALANGINIANO

FORMAZIONE BARRACÙ
BUU Calciruditi selcifere alternate a sottili livelli di marne siliciziate a radiolari e selci stratificate. Presenza di livelli decimetrici di calciruditi con litoclasti di piattaforma carbonatica. Spessore da 20 a 50 m. Presenza di radiolari, di nannofossili (*Watznaueria barnesae* associata a *Discorhabdus*) e di Saccocoma sp. nella porzione superiore. Ambiente di pendio deposizionale-bacino. Limite inferiore brusco su basalti e sulle calciruditi della BOO.
BAJOCIANO INFERIORE - TITONIANO INFERIORE

CALCARI DI S. MARIA DEL BOSCO
BOO Calciruditi pelagiche biancastre, a volte avana, a luoghi rosate e nodulari, in strati centimetrici e decimetrici, con intercalazioni di marne grige o verdastre con ammoniti, foraminiferi (*Paraglungulina gr. lenera, Marginulina prima, Globuspirillina* sp., *Lenticulina* sp., lagenidi, protoglobigerinidi) nella porzione sommitale). Nannofossili delle zone NJT 4 (*S. cruciulus*) ed NJT 5 (*L. fasciffi*); spessore da 80 a 100 m. Presenza di rari banchi di calciruditi con elementi derivanti da carbonati di piattaforma del Triassico Superiore-Giurassico Inferiore. Nella porzione superiore o al passaggio fra questa unità e la soprastante formazione Barracù sono presenti intercalazioni di lave basaltiche a pillow e laboidi con spessore massimo di 100 metri (BOO$_2$). Ambiente di scarpata deposizionale-bacino. Limite inferiore continuo sulle calcareniti oolitiche GUD.
PLIENSBACHIANO SUPERIORE - BAJOCIANO INFERIORE

CALCARI OOLITICI DI MONTE GENUARDO
GUD Calcareniti torbiditiche oolitico-bioclastiche di colore bianco, alternate a sottili livelli di calciruditi a radiolari. Il materiale bioclastico è rappresentato da alghe calcaree, foraminiferi, molluschi, ed echinodermi. Spessore complessivo 80 m. Ambiente di pendio deposizionale. Limite inferiore discordante su CZP.
HETTANGIANO - PLIENSBACHIANO INFERIORE

FORMAZIONE COZZO DI LUPO
CZP$_2$ Dolomie e calcari dolomitici biancastri, massivi, costituiti prevalentemente da bioliti e breccie con spugne, rari coralli e foraminiferi (*Galeanella pantcae, Galeanella laticarinata, Siculocosta battaglerisis*). Questi depositi passano lateralmente e verso l'alto a dolomie bianco grigiastre, vacuolari, in banchi piani paralleli di spessore metrico (CZP$_1$). Spessore affiorante circa 200 m. Ambiente di scogliera, avanscogliera e scarpata. Limite inferiore non affiorante.
CZP$_1$
CZP
NORICO - RETICO


SCHEMA TETTONICO
0 4 Km
Depositi quaternari continentali
Depositi quaternari marini
Depositi lacustri (Pliocene)
Depositi terrigeni (Pliocene - Messiniano)
UNITÀ SICANE
UNITÀ TETTONICA M. GENUARDO
UNITÀ SACCENSE
UNITÀ TETTONICA M. TRIGNA
UNITÀ TETTONICA F. SOSIO - M. LUCERTO
Sub-unità tettonica Burgio
Sub-unità