FOGLIO 026 APPIANO

Scala 1:50.000 — Servizio Geologico d'Italia (2007) – *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, f. 026 Appiano*. ISPRA, Roma.
doi: 10.5161/carg.f211581

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Geologico

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Geologia e prove materiali
Amt für Geologie und Baustoffprüfung

APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Geologico d'Italia
Organo Cartografico dello Stato (Legge 68 del 2.2.1960)

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Tra cliccabile geologico 1:25000

APPIANO
FOGLIO 026
alla Carta 1:50000 dell'ID.LM.

RESPONSABILE DI PROGETTO: S. Ciocci¹ (M), Nardin fino al 1997, L. Veronese fino al 1998) (TN), L. Nössing² (BZ)
COORDINAMENTO SCIENTIFICO: A. Bosellini³
DIRETTORI DI RILEVAMENTO: C. Neri⁴ (Quaternario), G. M. Bargossi⁵ (Vulcanico e Basamento Sudalpino), C. Nori⁶ (Sedimentario), G. Prosser⁷ (Sedimentario Austroalpino)

RESPONSABILI DELL'INFORMATIZZAZIONE: G. Tonnarini⁷ (TN), C. Strada⁷ (BZ)

1 - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico; 2 - Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Geologia e prove materiali;
3 - Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Ferrara; 4 - Dipartimento di Geografia, Università degli Studi di Padova;
5 - Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Università di Bologna; 6 - Dipartimento di Scienze della Terra, Università della Calabria;
7 - Dipartimento di Scienze Geologiche, Università degli Studi della Basilicata; 8 - Museo Tridentino di Scienze Naturali; 9 - Libero professionista;

RILEVATORI: A. Borsato⁸ (B), A. Bonazza⁹ (D), C. Morelli⁸ (G), D. Barazzutti⁸ (F), F. Mulas⁸ (B), G. Prosser⁷ (F), G. Rigatti⁸ (D), M. Avanzini⁸ (D), M. Cucato⁸ (G)

Rilevamenti eseguiti negli anni: 1992 - 1999 (Trento), 1999 - 2003 (Bolzano)

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

SINTEMA POSTGLACIALE ALPINO
Comprende i depositi posteriori all'estinzione, locale, dell'ultima grande espansione glaciale.
Olocene — Depositi di versante, costituiti da clasti eterometrici a spigoli vivi, immersi in scarsa terra rossa, talora con intercalazioni sabbiose, a stratificazione orizzontale (depositi eluvio-colluviali di versante). Depositi di origine mista, fluviale e di frana in matrice, massivi o con intercalazioni di ghiaie e sabbie mal selezionate (depositi di debris-flow e di origine mista). Depositi di frana, costituiti da clasti da spigolosi a subarrotondati, da centimetrici a metrici, in matrice sabbioso-limosa o non glaciali. Ghiaie a tessitura da parzialmente aperta ad aperta, con elementi angolosi di provenienza locale, con tetto di versante, a luoghi di grandi dimensioni (detrito a grosso blocchi). Limi, limi sabbiosi ed argillosi, massivi, con scheletro ghiaioso assente o variabile (depositi colluviali). Ghiaie e sedimenti fini torrentizi (depositi alluvionali).
Limite superiore coincidente con la superficie topografica. Spessore 1-100 m.
PLEISTOCENE SUP./OLOCENE

SINTEMA DEL GARDA
Depositi glaciali, collegate con l'ultima grande espansione glaciale.
Olocene — Depositi morenici, a supporto di matrice limoso-sabbiosa bruna, con clasti eterometrici a spigoli smussati, talora striati, da addensati a molto addensati (till d'alloggiamento). Diamicton massivi a supporto di clasti e/o di matrice, da addensati a poco addensati (till d'ablazione e till indifferenziati). Ghiaie e ciottoli stratificati, spesso associati a lenti di sabbie fini limose, limi sabbiosi o argillosi, talora laminati (depositi di contatto glaciale).
Limite superiore coincidente con la superficie topografica o ricoincidente con PTS. Spessore variabile da alcuni m ad alcune decine di m.
PLEISTOCENE SUP. P.P.

Subsintema di Maiga Fontana Bianca (SGG₂)
Diamicton massivi a supporto di matrice e/o di clasti di provenienza locale (till indifferenziati). Blocchi di grandi dimensioni (fino a 10 m) di Porfido Quarzifero, Porfido di Cortaccia e Porfido di Ora (depositi di frana con trasporto glaciale). Diamicton massivi a grossi blocchi spigolosi, di provenienza locale (depositi di crollo glaciali).
Limite inferiore incoerente su substrato roccioso o su SGD; limite superiore coincidente con la superficie topografica o ricoincidente con PTS. Spessore variabile da pochi m ad alcune decine di m.
PLEISTOCENE SUP. P.P.

Subsintema di S. Paolo (SGG₁)
Sabbie fini e sabbie fini limose di colore bruno grigiastro, a stratificazione piano-parallela, talora con dropstone; localmente sono presenti livelli argillosi scuri e lenti di ghiaie a clasti arrotondati. Ghiaie a supporto clastico, massive o grossolanamente stratificate (depositi fluvioglaciali), associate a diamicton a supporto di matrice, talora clasto-sostenuti, massivi o grossolanamente stratificati (depositi di contatto glaciale). Diamicton massivi a supporto di matrice, talora clasto-sostenuti, a supporto di clasti, talora clasto-sostenuti, a supporto di matrice, talora clasto-sostenuti, con organizzazione in corsi di spessore metrico a geometria tabulare o lenticolare, localmente cineritizzati (depositi di contatto glaciale). Diamicton massivi a clasti subangolosi di provenienza locale (depositi di origine mista).
Limite inferiore con SLD o con SGD; limite superiore coincidente con la superficie topografica o ricoincidente con PTS. Spessore massimo stimabile in circa 160 m.
PLEISTOCENE SUP./P.P.

Subsintema di S. Pancrazio (BACINO DEL R. VALSURIN) (SGG₃)
Ghiaie a supporto clastico, da grossolanamente a mediamente stratificate, talora mal selezionate; diamicton a supporto di matrice o clastico, massivi, con clasti sia angolosi e subangolosi di provenienza locale, sia arrotondati (depositi di contatto glaciale e fluvioglaciali). Sabbie e limo a laminazione piano-parallela, talora con dropstone (depositi glaciolacustri). Ghiaie a supporto clastico, massive (depositi di versante).
Limite inferiore con il substrato roccioso o coperto; limite superiore coincidente con la superficie topografica o con PTS. Spessore massimo di almeno 100 m.
PLEISTOCENE SUP./P.P.

Subsintema di Cioz (BACINO DEL T. NOCE) (SGG₄)
Ghiaie grossolanamente stratificate con lenti di sabbia, a clasti più o meno arrotondati (depositi fluvioglaciali). Ghiaie grossolanamente stratificate, con intercalazioni di diamicton a supporto di matrice, lmi e sabbie laminate (depositi di contatto glaciale). Diamicton massivi a supporto di matrice, a clasti subangolosi e subarrotondati (depositi glaciali di provenienza prevalentemente locale (depositi di origine mista: di debris-flow e torrentizi).
Limite superiore coincidente con la superficie topografica, con PTG o localmente con SGD; limite inferiore con SGD e con substrato roccioso. Spessore decine di m.
PLEISTOCENE SUP./P.P.

SUPERSINTEMA DEL MONTE SPINALE (MS)
Comprende le unità stratigrafiche precedenti l'ultima grande espansione glaciale.

SINTEMA DI S. NICOLÒ
Ghiaie e brecce grossolanamente stratificate, localmente massive, a tessitura da parzialmente aperta ad aperta, con elementi da angolosi a subarrotondati, di provenienza locale, con tetto di versante, anche a gradoni (depositi di versante, anche a grosso blocchi). Diamicton a supporto clastico, localmente da matrice, a clasti dolomitici di provenienza locale (depositi di origine mista: di debris-flow e torrentizi).
Limite inferiore con il substrato roccioso o non visibile, limite superiore incoerente con SGD. Spessore massimo stimabile di circa 60 m.
PLEISTOCENE SUP.

SINTEMA DI CALDARO
Ghiaie da medie a grossolane, talora con piccoli massi, a tessitura prevalente a supporto di clasti o parzialmente aperta. Ghiaie sabbiose grossolanamente stratificate, con lenti di ghiaie e lenti di sabbia a stratificazione incrociata concava, sovraconsolidate e raramente cementate. Clasti arrotondati di metamorfiti, dolomie, vulcaniti e porfidi. Depositi di origine mista, fluviale e di frana in matrice sabbioso-limosa, matrice sabbiosa da alla grossolana, localmente limosa, di colore grigio (depositi alluvionali e fluvioglaciali).
Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o sepolti; limite superiore incoerente con SGD, SGG₄ o con PTG.
Spessore massimo stimabile in circa 100 m.
PLEISTOCENE MEDIO-PLEISTOCENE SUP.

SINTEMA DI FOIANA
Conglomerati poligenici ben cementati a stratificazione metrica, sia clasto-sostenuti sia a supporto di matrice sabbioso-limosa di colore bruno, con rari orizzonti ben selezionati, a tessitura aperta, e lenti di sabbie medio-grossolane. Clasti da subangolosi a ben arrotondati, di provenienza sia locale sia alloctona, di metamorfiti, dolomie, vulcaniti e, in subordine, porfidi, quarziti, calcari ed arenarie.
Limite inferiore erosivo su substrato roccioso; limite superiore erosivo con SGD. Spessore massimo di circa 40 m.
PLEISTOCENE MEDIO-PLEISTOCENE SUP.?

SINTEMA DEL RIO BARNES (BACINO DEL T. NOCE)
Diamicton a supporto di clasti e/o di matrice, massivi (till indifferenziati). Ghiaie grossolanamente stratificate, a supporto clastico, sovraconsolidate e sovente cementate, contenenti intercalazioni di sabbie; clasti costituiti prevalentemente da metamorfiti, subordinatamente da dolomie, vulcaniti e porfidi. Ghiaie, grumi e calcari (depositi alluvionali e fluvioglaciali). Ghiaie ad elementi angolosi (detrito di versante).
Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o con RPS, limite superiore incoerente con SGD e con SGG₂. Spessore massimo stimabile in circa 30 m.
PLEISTOCENE MEDIO-PLEISTOCENE SUP.

SINTEMA DEL RIO PESCARA (BACINO DEL T. NOCE)
Limi e sabbie terrimate, di colore bruno-rossastro, ben addensate, con lenti di ghiaia intercalate (depositi glaciolacustri). Ghiaie a supporto di clasti e/o di matrice, massivi (till indifferenziati). Ghiaie grossolanamente stratificate, a supporto clastico, sovraconsolidate e sovente cementate, contenenti intercalazioni di sabbie; clasti costituiti prevalentemente da metamorfiti, subordinatamente da dolomie, vulcaniti e porfidi. Ghiaie, grumi e calcari (depositi alluvionali e fluvioglaciali).
Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o con RPS; limite superiore incoerente con SGD e con SGG₂. Spessore massimo stimabile in circa 30 m.
PLEISTOCENE MEDIO

MAGMATISMO TARDO-ALPINO
Corpi intrusivi e filoniani collegabili all'attività magmatica che comprende tra l'Eocene ed il Miocene

FILONI BASICO-INTERMEDI
Filoni basaltici, andesitico-basaltici ed andesitici ad affinità calcalcalina. Sono di colore nero, grigio-verde o verde scuro, a tessitura da afanitica a porfirica, con fenocristalli di plagioclasio, pirosseno e biotite. Spessore 0,1-5 m. Tagliano il basamento Austroalpino, le vulcaniti e le coperture permo-mesozoiche.

FILONI ULTRABASICI
Filoni picro-basaltici ad affinità alcalina, di colore nero a tessitura microcristallina ad olivina, pirosseni, anfiboli e plagioclasi. Spessore da decimetrico a metrico. Tagliano la Granodiorite di Monte Croce ed il basamento Sudalpino.

Corpi intrusivi situati lungo la linea periadriatica

TONALITE
Piccoli corpi tonalitici, quarzo-dioritici e quarzo-gabbroici ("Lamelle periadriatiche Auct."). Hanno struttura fanerocristallina con marcata orientazione dell'abito mineralogico e della trama che risaltano rispetto alla composizione quarzo-plagioclasica biancastra. Spessore da decimetrico a 20-30 m.
OLIGOCENE

ALPI MERIDIONALI

CALCARI MILIONITICI
Calcari e calcari marnosi di colore biancastro, caratterizzati da pronunciata foliazione. Presente esclusivamente in zone di faglia, spesso all'interno di faglie regionali, tra la Linea della Giudicarie e, in qua la forte deformazione non consente l'attribuzione ad un'originaria formazione.

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PERMO-CENOZOICA

CALCARE DI NAGO
Calcareniti nummulitiche e calcari arenacei. Bioclasti rappresentati da alghe rosse con briozoi, nummuliti, discocicloidi, ed echinodermi. Limite inferiore graduale su PPF. Spessore circa 30 m.
EOCENE MEDIO-SUP.

FORMAZIONE DI PONTE PIA
Conglomerati poligenici grigi. Frazione terrigena dominante con abbondante quarzo.
Limite inferiore graduale su VAL. Spessore circa 20 m.
EOCENE INF./MEDIO ?

FORMAZIONE DI VAL D'AGOLA
Successione a forte componente terrigena che rappresenta un equivalente non-orientale del Flysch Lombardo. Tale unità viene suddivisa in tre membri:
Membro di Cima Carega e della Coste di Grual (VAL₃)
Marne calcaree e calcareniti grigie e nere con sottili intercalazioni di calcari micritici e biocalcareniti torbiditiche a componente siliciclastica (VAL₂); alternanza di calcitorbiditi bioclastiche e calcari micritici rosa, con livelli di clasti glomerali poligenici (VAL₁). Presenza di foraminiferi planctonici, discocicline e nummuliti. Limite inferiore graduale rapido su SAA. Spessore 3 -10 mm.
Membro di Novezzina (VAL₂)
Membro di Brogn dla Lòra (VAL₁)
Calcari micritici rosati, talora nodulari, con torbiditi di conglomerati e bioclastiti.
Limite inferiore non accertato. Spessore non inferiore a 60 m.
TURONIANO-SANTONIANO

SCAGLIA ROSSA
Calcari micritici rosati, marnosi o grigi in strati sottili separati da livelli argilloso-marnosi, con noduli e letti di selce nera. Alla base sono presenti 3-4 metri di micriti biancastre con selce grigia o nera e marne a noduli (Maiolica). Limite inferiore graduale rapido su ARN o DPR. Spessore 10 m.
TITONIANO-CENOMANIANO

SCAGLIA VARIEGATA ALPINA
Calcari micritici rosati, verdastri o grigi in strati sottili separati da livelli argilloso-marnosi, con noduli e letti di selce nera. Alla base sono presenti 3-4 metri di micriti biancastre con selce grigia o nera e marne a noduli (Maiolica). Limite inferiore graduale rapido su ARN o DPR. Spessore 10 m.
TITONIANO-CENOMANIANO

ROSSO AMMONITICO VERONESE
Calcari nodulari, calcari marnosi e subordinatamente di colore bianco-verdastro o rosso-rosato. Ai tetto calcari micritici biancastri a clasti, con limite inferiore netto su DPR tramite hardground. Spessore 0-15 m.
DOGGER-MALM (TITONIANO)

OOLITE DI SAN VIGILIO
Calcareniti ed encriniti oosolare in limitate scaglie tettoniche lungo la Linea delle Giudicarie Nord.
Limite inferiore non affiorante. Spessore non inferiore a 80 m.
TOARCIANO-ALEN.MIANO INF.

GRUPPO DEI CALCARI GRIGI
Comprende solo una formazione affiorante in scaglie tettoniche lungo la Linea delle Giudicarie.

FORMAZIONE DI ROTZO
Calcari micritici grigi, nodulari e/o ben stratificati a calcari oolitici in grossi banchi massicci.
Limite inferiore non affiorante. Spessore non inferiore ai 150 m.
SINEMURIANO-PLIENSBACHIANO

DOLOMIA PRINCIPALE
Dolomie più o meno ben stratificate, di colore variabile dal grigio scuro al nero a colore marrone. Dolomie con strutture di tipo algale, stromatolitiche con più raramente di dimensione paleocarsiche.
Limite inferiore graduale rapido su TNZ, parzialmente su SCI. Spessore 250-350 m.
CARNICO SUP./NORICO

FORMAZIONE DI TRAVENANZES
Dolomiti grigio-giallastre, talora con fiamme gialle o rosate in strati decimetrici intercalate a pelliti rosse, verdi e grigie. Localmente sono presenti livelli argillosi scuri e radici (paleosuoli). Limite inferiore netto su VAB o su RUF. Spessore 0-150 m.
CARNICO INF.

CONGLOMERATO DI RUFFRÈ
Conglomerati a matrice dolomitica ed elementi arrotondati calcarei e quarzosi subordinati in strati lenticolari in pelliti rosse. Limite inferiore netto ed erosivo su VAB o VVL. Spessore 0 -10 m.
LADINICO SUP.

VULCANITI BASALTICHE
Lave a basalti e brecce vulcaniche (VAB₂) con clasti vulcanici da arrotondati a spigolosi, ingobiati in una matrice della stessa natura dei blocchi.
Limite inferiore netto su SU o VVL. Spessore 0-100 m.
LADINICO SUP.

CALCARE DELLA VAL VELA
Calcari oolitoidali grigi con intercalazioni di argille smectitiche verdastre alla base. Calcari laminati neri/grigi in strati di 10-15 cm con silice nera. Limite inferiore transizionale su SLI. Spessore 0-50 m.
LADINICO (ZANCLEOLENSE)

FORMAZIONE DELLO SCILIAR
Arenarie e siltiti grigio-verdastre in banchi metrici. Livelli di pelliti rosse al tetto dei cicli peritidali.
Limite inferiore graduale rapido su CTR. Spessore 150-300 m.
ILLIRICO INF./TASSANICO INF.

FORMAZIONE DEL CONTRIN
Dolomie grigio chiare in strati fino al metro con giunti piano-paralleli e al tetto orizzonti interstrati di dolcareniti grigio-verdastre. Limite inferiore parzialmente su BVL. Spessore 80-150 m.
ILLIRICO P.P.

FORMAZIONE DI GIOVO
Successione litologicamente eterogenea che comprende sia carbonati che depositi clastici. Si distinguono tre membri generalmente e parzialmente eteropici:
Membro del Monte Ozol (GIV₁)
Calcari micritici grigi, nodulari e/o ben stratificati in strati sottili moderatamente bioturbati con abbondanti resti di crinoidi.
Limite netto su GIV₂. Spessore 10-40 metri.
Membro di Cortaccia (GIV₂)
Siltiti e marne grigio-scure ricche di frustoli vegetali cui si sovrappone un'alternanza di tipo peritidale di calcari e arenarie silicee grigio-gialliastre. Limite inferiore netto su VTS o su GIV₁.
Membro del Passo Palade (GIV₃)
Litareniti grigio-giallastre e conglomerati a stratificazione incrociata e gradati con talora abbondanti resti di vegetali silicizzati. Limite inferiore netto su VTS. Spessore 0-50 metri.
PELSONICO P.P.

CONGLOMERATO DI VOLTAGO
Siltiti e arenarie rosse e grigie bioturbate. Conglomerati a ciasti dolomitici biancastri immersi in matrice arenacea. Limite inferiore discordante su SLS, ANG e SLI. Spessore 20-130 m.
PELSONICO P.P.

FORMAZIONE A GRACILIS
Dolomie calcareo-marnose e calcari grigi, in strati da tabulari a nodulari per bioturbazione, con intervalli marnoso-siltosi grigi. Limite inferiore netto su SLI. Spessore 0-40 m.
BITHYNO-PELSONICO INF.

CALCARE DI ANGOLO
Dolomie e calcari scuri fino a neri, in strati tabulari, nodulari nella parte inferiore, filtamente stratificati nella parte alta della successione. Limite inferiore transizionale, rapido su BOV. Spessore 30-120 m.
BITHYNO-PELSONICO INF.?

CARNIOLA DI BOVEGNO
Dolomie evaporitiche grigio-gialliastre dal tipico aspetto a "cellette", breccia dolomitiche e marne. La formazione è eteropica con SLI. Limite inferiore netto e concordante su MES. Spessore 20-50 m.
OLENEKIANO SUP./ANISICO INF.

DOLOMIA DEL SERLA INFERIORE
Dolomie cristalline di color grigio chiaro o biancastre. Superfici di esposizione subaerea arrossate e paleokarsi. Nella parte inferiore sono talvolta riconoscibili dolomie nerastre stratificate alternate a gessi e marne verdi o rosse. Limite inferiore netto su MES. Spessore 20-60 m.
OLENEKIANO SUP./ANISICO INF.

FORMAZIONE DI WERFEN
La formazione è costituita da una complessa alternanza di sedimenti carbonatici, terrigeni e misti variciolori di ambiente da subtidale a sopratidale. Si distinguono:
Membro di San Lucano, Cencenighe e Val Badia (WER₄ = WER₃ + WER₂)
Peliti e siltiti grigie, grigio-verdi con livelli evaporitici (WER₃); dolomie arenacee e dolomie oolitico-bioclastiche rossastre (WER₂); calcari marnosi e siltiti grigi, bioturbati, con calcareniti, e dolomie arenacee (WER₁). Spessore 80-140 m.
Membro di Campil e Dosso e gasteropodi (WER₂ + WER₁)
Alternanza fra siltiti rosse in strati centimetrici, con subordinate dolomie silicoso-arenacee, dolomie granulari gialle, e marne rosse e grigie (WER₂); calcari siltosi, selci calcaree e calcareniti oolitico-bioclastiche rosse contenenti gusci di gasteropodi e bivalvi (WER₁). Spessore 30-50 m.
Membro di Siusi e Dizzoniello di Andraz. (WER₂ + WER₁)
Alternanza di calcari marnosi e marnoso-siltosi giallastri, con calcareniti oolitico-bioclastiche (WER₂); dolomie marnose giallastre vacuolari e siltiti rosse (WER₁). Spessore 30-50 m.
Membro di Mazzin e di Tesero (WER₂ + WER₁)
Alternanza di dolomie cristalline grigio-giallastri e marne in lamine centimetriche (WER₂); dolomie oolitiche e grana grossolana grigio-giallastre in banchi, con cavità e noduli di gesso (WER₁). Spessore 15-20 m. Limite inferiore netto paraconcordante su GAR.
PERMIANO SUP P.P./OLENEKIANO INF.

ARENARIA DI VAL GARDENA
Arenarie continentali rosse, grigie e bianche poco compatte, alternate a siltiti rosse o grigie, siltiti marnose e marne. Alla base sono presenti 3-4 metri di micriti biancastre con selce grigia o nera e marne a noduli (Maiolica). Limite inferiore netto paraconcordante sul erosivo su vare formazioni del Gruppo Vulcanico Atesino. Spessore 50-150 m.
PERMIANO SUP. PP.

MAGMATISMO PERMIANO

GRUPPO VULCANICO ATESINO

FORMAZIONE DI ORA
Alternanza di strati di colore da grigio-rosso ad arancio, con netta e regolare fessurazione subverticale. Abbondanti cristalli (1-2 mm) di sanidino, plagioclasi e quarzo in una pasta di fondo felsitica fluidale (ignimbriti). Frequenti inclusi juvenili porfirici. Limite inferiore netto concordante o discordante su IGR, e LAR. Spessore almeno 600 m.

Membro di Predonico (ORA₁)
Lapilli-tuff e tuff ricchi rose caratterizzati da cristalli più piccoli e rari, e maggior presenza di lamine. Alla base di alcuni strati sono presenti fino a 10 cm di arenarie grigio-verdi con pasta di fondo cineritenacea. Limite inferiore discordante su TSN, LWN, RBL e IGR. Spessore 0-200 m.
PERMIANO INF. PP.

FORMAZIONE DI TRIGOVIO
Depositi sedimentari e vulcanoclastici ben stratificati in cui si distinguono due litofacies:
Facies conglomeratica (TGV₂): conglomerati a sostegno di matrice con clasti vulcanici decimetrici a generale assetto caotico (debris flow). Locali intercalazioni di arenti tarrivate.
Facies arenitica (TGV₁): arenarie, siltiti e peliti rosse in strati centimetrici sottili di arenarie silltose, calcari siltosi e peliti. Il colore grigio scuro o nero. Fluidal cataclastica e noti di partite.
Limite inferiore netto ed erosivo su IGR, LAR e IGS. Spessore 0-250 m.
PERMIANO INF. PP.

PERIDOTITI
Pericoti di colore verde scuro (gialloastro sulle superfici alterate) composte da olivina, clinopirosseno, ortopirossino, anfibolo; o spinello e ± flogopite. Affiorano in boudins di spessore metrico-decametrico nelle zone della Vedetta Alta, del M. Comicioio e del Monte di Marano.

ORTOGNEISS
Ortogneiss grigio a porfiroide pre-varisico, biancastri, generalmente a grana fine, in corpi di modesto spessore tra gli scisti all'interno di TUN. A volte sono caratterizzati da una tessitura occhiadina.
Ortogneiss con occhi di feldspato (TUG₂): bande di ortogneiss con occhi centimetrici di feldspato in matrice quarzo-micacea, sono presenti nuclei di ortogneiss a grana più fine.

UNITÀ DEL TONALE

PARAGNEISS A SILLIMANITE (TSP)
Paragneiss a grana fine, grigi, color ruggine sulle superfici alterate, con orvedente scistosità. Associazione mineralogica con biotite, muscovite, granato ± fi-feldspato e sillimanite.

ORTOGNEISS
Ortogneiss a protolite pre-varisico in scisti bandi di spessore metrico; talvolta associati a corpi di anfiboliti (TTA). Sono caratterizzati da una tessitura occhiadina con occhi di feldspato fino a 2 cm di diametro. Associazione mineralogica con quarzo, K-feldspato, plagioclasio, clorite e sericite.
Gneiss con occhi di feldspato (TTG₂): bande di gneiss occhiadoni di color grigio scuro, presenti in prossimità della Linea di Rumo.

ANFIBOLITI
Anfiboliti a bande caratterizzate da un layering differenziato, millimetrico con livelli anfibolici scuri alternati a livelli chiari a plagioclasio e quarzo. Talvolta si osserva macroscopicamente il granato.

MARMI
Sottili orizzonti di marmi bianchi in letti di spessore decimetrico visibili in un unico affioramento localizzato presso la cima del M. Comicioio.

SOVRASSEGNI DELLE UNITÀ QUATERNARIE

- a — deposito di versante
- b — deposito di versante a grossi blocchi
- c — deposito di frana
- d — deposito di frana antica
- e — deposito colluviale
- f — deposito di debris flow
- g — deposito di origine mista: debris flow e/o torrentizia e/o valanga
- h — deposito alluvionale e fluvioglaciale (ghiaia)
- i — deposito alluvionale e fluvioglaciale (sabbia)
- l — deposito alluvionale e fluvioglaciale (limi)
- m — deposito lacustre
- n — paludi attuali
- o — deposito palustre (torba)
- p — deposito palustre (torba)
- q — deposito glaciale (till indifferenziato)
- r — deposito glaciale (till di alloggiamento)
- s — deposito glaciale (till di ablazione)
- t — deposito di contatto glaciale
- u — deposito glaciolacustre
- v — deposito di frana con trasporto glaciale

Fuori presenti in carta, non compaiono in legenda le combinazioni dei singoli sovrassegni.

- stratificazione di origine primaria
- cineritizzazione di origine primaria
- stratificazione rovesciata
- superfici di clivaggio o scistosità inclinata
- contatto stratigrafico
- faglia con indicazione della immersione e della inclinazione (se visibile)
- faglia diretta
- faglia inversa
- faglia trascorrente
- faglia trascorrente sinistra
- faglia trascorrente destra
- faglia transtensiva destra
- faglia transpressiva destra
- faglia transpressiva sinistra
- faglia sinistra/destra
- sovrascorrimento
- orlo di terrazzo alluvionale
- orlo di scarpata di frana
- traccia di alveo fluviale abbandonato
- gradino di scivolamento
- trincea di deformazione gravitativa profonda
- traccia di superficie assiale sinclinale
- traccia di superficie assiale anticlinale
- traccia di superficie assiale sinforme
- traccia di superficie assiale antiforme
- deformazione gravitativa profonda di versante
- zona cataclastica
- zona di taglio duttile
- area di alterazione idrotermale
- complesso filoniano
- argine morenico
- rockglacier
- conoide alluvionale
- conoide di origine mista (torrentizio e/o di debris flow ed/o alluvionale)
- depressione, area soggetta a sprofondamento
- miniera inattiva
- discarica
- cava attiva, inattiva
- cava adibita a discarica
- deposito antropico
- traccia di sezione geologica

SCHEMA TETTONICO

Scala 1:200000



SCHEMA DI INQUADRAMENTO REGIONALE



Plutoni terziari
PENNINICO
Calcescisti con ofioliti
Zona a scaglie di Matrei
Zona di Arosa (Flysch cretaceo-eocenici)
Mesozoico (Fm. Engadina)
Basamento cristallino e relative coperture
Gneiss centrale

AUSTROALPINO
Sedimenti permo-mesozoici
Plutoni permiani
Complesso di Monteneve
Basamento metamorfico di basso grado
Basamento metamorfico di medio ed alto grado
sovrascorrimento tra unità principali
sovrascorrimento secondario
linea tettonica

ALPI MERIDIONALI
Sedimenti cretaceo-paleogenici
Sedimenti permo-giurassici
Plutoni triassici
Vulcaniti permiane
Plutoni permiani
Basamento metamorfico di basso grado
lineamento Periadriatico

SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI DELLA SUCCESSIONE SEDIMENTARIA



Formazioni che non compaiono in carta: Enconà del Reier (BP).



Copyright by APAT - Dipartimento Difesa del suolo - 2007

Dal foglio dell'Istituto Geografico Militare Aeronautico/serie 50M n° 4701 del 04-05-1956)
Carta Ufficiale dello Stato - Legge n. 68 del 2.2.1960. Tutti i diritti di riproduzione e di rielaborazione riservati

Progetto CARG - Legge 305/99 Direttore Responsabile: L. Serva



SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI DEL GRUPPO VULCANICO ATESINO E DEI CORPI PLUTONICI E SUBVULCANICI



Datazioni radiometriche su zirconi

Banca dati, allestimento cartografico digitale e stampe: SYSTEMCART Srl, Roma