FOGLIO 043 MEZZOLOMBARDO

Servizio Geologico d'Italia (2007) - *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, F. 043 Mezzolombardo*. ISPRA, Roma.
DOI: 10.15161/oar.it/211503

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Dipartimento difesa del Suolo Legge 68 del 2.2.1960

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Geologico

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ufficio Geologia e prove materiali
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Amt für Geologie und Bausttoffprüfung

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

alla scala 1:50.000 dei rilevamenti geologici 1:25.000

MEZZOLOMBARDO
FOGLIO 043

alla Carta 1:50.000 dell' U.G.N.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: S. Cocco*, V. Maio*
COORDINAMENTO SCIENTIFICO: M. Cosentino*, G. Monteli*, a.c. M. Rimoldi* (dir.)
DIRETTORI DEL RILEVAMENTO: M. Avanzini*(Substrato sedimentario pre-Quaternario)
G.M. Bergonzi*(Substrato vulcanico),
A. Bertolini*, a.M. Cucato* (Coperture quaternarie)

ESPERTO: L. Selli *(Geologia strutturale)*

1 - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico
2 - Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Geologia e prove materiali
3 - Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Bologna
4 - Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento
5 - Libero Professionista

SUDDIVISIONE DEI RILEVAMENTI ALLA SCALA 1:10.000
RILEVAMENTI: E. Abbà (a), M. Casati (b), C. Monelli* (a), M. Rimoldi* (d),
M. Antoniazzi* (c), R. Tentonel* (f), E. Cocolari (f), G. Zecchetti* (g),
F. Fassoni* (h), M. Mariani (i), R. Vallone (i), D. Vernesi (i), M. Spanò* (j).

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI APPARTENENZA

SINTEMA POSTGLACIALE ALPINO
Ghiaie, sabbie, limi a stratificazione orizzontale o inonclata (depositi alluvionali). Limi, argille, torbe, talora con intercalazioni sabbiose, a stratificazione orizzontale (depositi palustri e lacustri). Diamicton a supporto di clasti e/o di matrice, massivi o con intercalazioni di ghiaie e sabbie mal selezionate (deposti da debris-flow e di origine mista, cioè da debris flow e/o torrentizio e/o di valanga). Blocchi e ghiaie eterometriche, diamicton a supporto di clasti e/o di matrice (accumuli gravitativi). Ghiaie con elementi angolosi di provenienza locale (depositi di versante), a luoghi di grandi dimensioni (deposti di versante a grossi blocchi). Depositi colluviali e Travertino. Depositi antropici. Cementazione discontinua e assente. Limite superiore coincidente con la superficie topografica. Spessore massimo di oltre 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P. - OLOCENE*

SINTEMA DEL GARDA
Diamicton massivi a supporto di matrice limoso-sabbiosa, sovraconsolidati (till d'alloggiamento). *Diamicton* massivi a supporto di clasti e/o di matrice (till d'ablazione e till indifferenziati). *Diamicton*, sabbie, ghiaie, talora cinostratificate, e limi da massivi a laminati (deposti di contatto glaciale e glaciolacustri). Ghiaie massive o grossolanamente stratificate, con intercalazioni sabbiose (deposti fluvioglaciali). Cementazione generalmente assente. Limite inferiore erosivo; limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con SGD_1. SGD_1, SGD_2, SGD_3, PTS. Spessore massimo di oltre 90 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

GRUPPO DI FORTE CASARA
Ghiaie e breccie cinostratificate a tessitura da aperta a parzialmente aperta con clasti da angolosi a subangolosi (depositi di versante e di origine mista). Cementazione variabile da blanda a pervasiva. Presenza di fratture carsificate e clasti alterati dall'interno. Limite inferiore con il substrato roccioso o con RIR, limite superiore inconforme con SGD_1. SGD_2 e PTS/ con morfologia ancora ben valla, lateralmente e talora verso monte. Spessore fin oltre 100 m. *PLEISTOCENE INF. - PLEISTOCENE SUP. P.P.*

SOTTOBACINO DELL' E. NOCE

Subsintema di Mollaro
Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie massive o con grossolana stratificazione orizzontale o inonclata planare (depositi fluvioglaciali e alluvionali). Alternanze di sabbie laminate e limi con lenti di ghiaie, ghiaie sabbiose e diamicton a supporto di matrice, spesso deformati e ripiegati (deposti di contatto glaciale). Argille a limi (depositi lacustri). Ghiaie a struttura aperta e a supporto di clasti subangolosi (deposti di origine mista e di debris-flow). Ghiaie eterometriche con massi (deposti di frana). Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o inconforme con SGD_1, SGD_2, SGD_3, PTS. Spessore massimo di circa 90 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

Subsintema di Malè
Diamicton massivi a supporto di matrice limoso-sabbiosa, sovraconsolidati (till d'alloggiamento). *Diamicton* massivi a supporto di clasti e/o di matrice (till d'ablazione e till indifferenziati). Sabbie e sabbie limose sovraconsolidate alternate ad argille laminate (depositi glaciolacustri). Ghiaie massive o grossolanamente stratificate alternate a sabbie a stratificazione inonclata (deposti fluvioglaciali). *Diamicton* massivi, a supporto di matrice sabbioso-limosa, sabbie, talora a stratificazione inonclata, alternate a livelli ghiaiosi; presenza di deformazioni da glaciotettonica (depositi di contatto glaciale). Cementazione discontinua o assente. Limite inferiore erosivo con RIR o SGD_1 limite superiore inconforme con PTS. Spessore massimo di oltre 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

Subsintema di Cles
Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie da massive a grossolanamente stratificate (deposti fluvioglaciali e/o alluvionali). Ghiaie cinostratificate, sabbie e limi laminati (deposti di contatto glaciale). *Diamicton* massivi, ghiaie a struttura aperta o a supporto di clasti subangolosi prevalentemente carbonatici (deposti di origine mista e di debris-flow). Cementazione blanda o assente. Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o inconforme con SGD_2 o RIR/. limite superiore inconforme con SGD_{3-4} PTS. Spessore massimo di oltre 40 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

SINTEMA DEL RIO BARNES
Ghiaie, ghiaie sabbiose da massive a ben stratificate con sottili intercalazioni sabbiose (deposti fluvioglaciali e/o alluvionali). Ghiaie cinostratificate, sabbie e limi laminati (deposti di contatto glaciale e glaciolacustri) con presenza locale di ghiaie a struttura aperta o a supporto di clasti subangolosi (deposti di debris-flow). Cementazione variabile da discontinua a pervasiva. Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o inconforme con RPS; limite superiore inconforme con SGD_1. SGD_2 o SGD_{3-4} Spessore di oltre 100 m. *PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUP. P.P.*

SINTEMA DEL RIO PESCARA
Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie da massive a grossolanamente stratificate (depositi alluvionali). Cementazione terrazze e pervasiva. Limite inferiore non affiorante; limite superiore inconforme con RBR. Spessore massimo di oltre 15 m. *PLEISTOCENE INF. - PLEISTOCENE MEDIO*

BACINO DELL' ADIGE E SOTTOBACINO DELL' ATESINO

Subsintema di San Paolo
Ghiaie grossolanamente stratificate ed embricate, con clasti arrotondati prevalentemente metamorfici (deposti fluvioglaciali). Ghiaie sabbiose, diamicton massivi e sabbie (deposti di contatto glaciale). Sabbie e limi con incluse ghiaiose, a stratificazione orizzontale o cinostratificate, talora con pieghe a vera scala e faglie (deposti glaciolacustri). *Diamicton* a supporto di matrice, massivi (till d'ablazione). Diamicton a supporto di matrice e di clasti, ghiaie grossolanamente stratificate a clasti subangolosi prevalentemente di provenienza locale (deposti di origini miste). Limite inferiore con CLD o con SSD indistinto; limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con PTS. Spessore massimo di circa 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

Subsintema di Lisignago
Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie da massive a grossolanamente stratificate (deposti fluvioglaciali e/o alluvionali). Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie stratificate, limi laminati, diamicton massivi a supporto di matrice e/o di clasti (deposti di contatto glaciale). Ghiaie massive o grossolanamente stratificate, diamicton a supporto di matrice (deposti di origine mista e di debris-flow). *Diamicton* massivi a supporto di clasti e/o di matrice, (till d'ablazione e till indifferenziati). Blocchi e ghiaie eterometriche (accumuli gravitativi). Ghiaie con elementi angolosi di provenienza locale (depositi di versante). Cementazione scarsa o assente. Limite inferiore con SGD_3 o SG_1 limite superiore inconforme con PTS. Spessore massimo circa 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

SINTEMA DI CALDARO
Ghiaie, ghiaie e sabbie, grossolanamente stratificate, con lenti di sabbia a stratificazione inonclata concava, sovraconsolidate e raramente cementate (deposti alluvionali e fluvioglaciali). Ghiaie e breccie cinostratificate, localmente massive, a tessitura da parzialmente aperta ad aperta, con elementi eterometrici di provenienza locale (deposti di versante, anche a grossi blocchi). *Diamicton* a supporto clastico, localmente di matrice, a clasti di provenienza locale (deposti di origine mista). Cementazione da assente a pervasiva. Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso, con NON o sepolto, limite superiore inconforme con $SG2$. SG_3, SG_4 o con PTS. Spessore massimo di oltre 200 m. *PLEISTOCENE MEDIO (?) - PLEISTOCENE SUP.*

SINTEMA DI PENONE
Ghiaie eterometriche, talora con massi, in genere a supporto clastico; breccie variamente cementate, massive o grossolanamente stratificate (deposti di origine mista). *Diamicton* massivi a supporto di matrice cementati (till d'ablazione). Depositi comunemente sovraconsolidati. Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o sepolto, limite superiore erosivo con CLD. Spessore massimo di circa 70 m. *PLEISTOCENE MEDIO (?) - PLEISTOCENE SUP.*

SUPERSINTEMA DI ADIGARÈ
Ghiaie a stratificazione orizzontale o inonclata con clasti da ben arrotondati a subarrotondati, con intercalazioni di sabbie (deposti alluvionali). Ghiaie e breccie a struttura aperta o a supporto di clasti subangolosi (deposti di debris-flow). Cementazione da discontinua a pervasiva; alterazione da lieve a molto spinta. Limite inferiore erosivo, limite superiore inconforme con $SG2$, $SG3_{-4}$ o PTS. Spessore di oltre 50 m. *PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUPERIORE P.P.*

FORMAZIONE DI FAEDO
Breccie stratificate a supporto di clasti di siltiti e dolomie, con matrice e locali intercalazioni siltoso-sabbiose rossastre (deposti di debris-flow). Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o sepolto, limite superiore inconforme con $SG2$ o PTS. Spessore di oltre 60 m. *PLEISTOCENE INF. (?) - PLEISTOCENE MEDIO*

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PERMO - CENOZOICA

FORMAZIONE DI PONTE PIÀ
Calcari micritici lastriformi, selciferi, grigio chiari con intercalazioni di marne azzurrognole e prevalenti marne nella parte superiore. Limite inferiore graduale su VAG_3 o VAG_4 o SAA. Spessore: 70 m. *EOCENE MEDIO - SUP.*

FORMAZIONE DI VAL D'AGOLA
Successione in prevalenza terrigena divisa in tre membri dei quali nel Foglio affiorano i due superiori. La formazione è eteropica con SAA e RPP.

Membro del Sasso di Camp/glio
Marne calcaree grigie e nere con sottili intercalazioni di calcari micritici scuri a cui si alternano torbiditi carbonatiche con marcata frazione terrigena a quarzo e biotite. Limite inferiore graduale su SAA. Spessore: 0-20 m. *EOCENE MEDIO*

Membro della Coste del Gruel
Calcari micritici rosei (con subordinate intercalazioni di marnoi) in facies di Scaglia Rossa a "Globotruncana" ben stratificati (0-30 cm). Limite inferiore graduale su SAA. Spessore: 0-90 m. *CAMPANIANO - MAASTRICHTIANO*

SCAGLIA ROSSA
Calcari micritici lastriformi (5-15 cm) rosei, selciferi nella parte inferiore, con intestrati marnosi e marne, a foraminiferi *planctonici* e talora *inocerami*. Al tetto unità pluristratica foglietata ("bancone maastrichtiano" Auct.) localmente con hardground apicale. Limite inferiore graduale e discordante su VAA. Spessore: 70-200 m. *CRETACEO SUP. - PALEOCENE*

SCAGLIA VARIEGATA ALPINA
Calcari micritici e calcari marnosi grigi scuri, rosati e biancastri a radiolari e foraminiferi, di sotto bizzarati con tipiche "lamme" grigiastre, ben stratificati (5-15 cm), talora selciferi. Marne scure, talora bituminose foglettate. Limite inferiore tranzionale rapido su MAI o inconforme su ARV. Spessore: 20-70 m. *APTIANO – CENOMANIANO*

MAIOLICA
Calcari micritici ben stratificati a grana finissima generalmente rosati e biancastri alla base. Limite inferiore graduale rapido su ARV. Spessore: 0-20 m. *TITONIANO SUP. – BARREMIANO SUPERIORE*

ROSSO AMMONITICO VERONESE
La Formazione è costituita da tre intervalli non distinti cartograficamente. Alla base calcari micritici a lamellibranchi pelagici (tipo *Bositra*) e protoglobigerinidi, mal stratificati e a struttura nodulare di colore generalmente bianco, rosato o verdastro spesso completamente dolomitizzati. Nella parte intermedia, non sempre rappresentata, calcari rossastri ben stratificati con fitte intercalazioni di selce rossa in lett e livelli cinentici. Nella parte superiore calcari micritici nodulari rossi ad Ammoniti. Limite inferiore netto, paraconcordante su DPR, RTZ ed EPE. Spessore: 5-50 m. *BAJOCIANO SUP. – TITONIANO INF.*

ENCRINITE DEL PELLER
Calcari gialliasti a crinoidi, in strati spessi e a stratificazione inonciata che passano lateralmente ad encriniti pure di colore giallastro e rossastro. Limite inferiore netto su RTZ$_1$. Spessore: 0-40 m. *TOARCIANO – BAJOCIANO INF.*

GRUPPO DEI CALCARI GRIGI
Comprende quattro formazioni di piattaforma carbonatica, tre delle quali presenti nell'area del Foglio.

FORMAZIONE DI ROTZO
Calcari bioclastici da grigio chiaro a bruno organizzati in sequenze di spessore da metrico a decametrico. La parte superiore è caratterizzata da fitti banchi a lamellibranchi giganti (*Lithiotis, Cochlearites, Lithiopinna* e *Gervilleiopsis*). Limite inferiore netto su LOF e localmente su FMZ. Spessore: 80-120 m. *SINEMURIANO – PLIENSBACHIANO*

Membro di Tovel
Calcari oolitici e oolitico bioclastici in strati compatti con spugne e coralli. Limite inferiore graduale rapido su RTZ.Spessore: 150-170 m. *SINEMURIANO – PLIENSBACHIANO*

CALCARE OOLITICO DI LOPPIO
Calcari oolitico-intraclastici grossolani di colorazione biancastra o grigio-chiara con rare laminazioni inonciate in strati da medi a spessi. Limite inferiore netto su FMZ. Spessore: 35 - 40 m. *SINEMURIANO P.P.*

FORMAZIONE DI MONTE ZUGNA
Calcari grigio chiari fino a biancastri prevalentemente micritici bioturbati con intercalazioni di pelli rossastre e verdi alla base, che passano a calcari stromatolitici e a calcari micritici scuri nodulari nella parte superiore. Limite inferiore netto su ZUG, gradualle sfumato in presenza di facies dolomitizzata su DPR, netto su paleosuolo DPR. Spessore: 100-250 m. *HETTANGIANO – SINEMURIANO P.P.*

CALCARE DI ZU
Comprende tre membri dei quali due, uno di marga carbonatica ed uno superiore di ambiente peritidale affiorano nell'area del Foglio a ovest della Linea Trento -Cles.

Membro di Tremalzo
Calcari micritici e calcari dolomitici grigio-scuri, bioturbati, con megalodontidi, calcari stromatolitici grigio-chiari con struttura da disseccamento e brecciole intraclastiche. Strati medio-spessi. Limite inferiore graduale su ZUG. Spessore: 120 m. *RETICO*

Membro dei Grostè
Calcari micritici grigio-scuri, marne e argilliti nere, biocalcareniti gradate a molluschi e brachiopodi in strati medio-sottili. Localmente ceapi di coralli. Limite inferiore netto concordante su DPR. Spessore: 40-50 m. *NORICO? – RETICO*

DOLOMIA PRINCIPALE
Dolomie gallisette e grigio - bruna, localmente fetide alla percussione, in strati decimetrici leggermente ondulati con interstrati millimetrici marnosi di colore giallastro alla base. La porzione medio superiore è dominata da cicli costituiti da dolomie bianche ricche in alghe e bivalvi e laminazioni stromatolitiche. Limite inferiore netto su TVZ discordante su SCI. Spessore: 300-400 m, fino a 1000 m nell'angolo nord occidentale, ad ovest della Linea Trento-Cles, dove non affiora la base. *CARNICO SUP. – RETICO P.P.*

FORMAZIONE DI TRAVENANZES (ex Fm. di Raibl)
Dolomie alternitte grigio-chiare e gallisette in strati decimetrici separate da sottili intercalazioni di marne verdastre. Alla base sono talora visibili conglomerati a matrice dolomitica ad elementi arrotondati prevalentemente calcarei, più raramente quarzosi. Limite inferiore netto su VVI, (osservato solo in gallerie), VNB e SCI. Spessore: 30 m. *CARNICO P.P.*

VULCANITI BASALTICHE
Lave andesitico-basaltiche, in alcuni casi alterate e spesso fratturate di colore nero-verdastro; sono presenti in corpi di limitata estensione con spessori di alcune decine di metri fino a massimo 150 m. Affiorano a tetto di SCI, sotto forma di corpi stratoidi entro CTR e come piccoli filoni sinsi in WER. Limite inferiore discordante su SCI. Spessore: 0-150 m. *LADINICO SUP.*

CALCARI DELLA VAL VELA
Calcari grigio chiaro, nocciola, gallastri fittamente laminati in strati decimetrici separati da sottili intercalazioni siltoso-argillose e livelli centimetrici di argilliti cora (simili/di da alla dell'unità). Localmente calcari scuri, laminati, bituminosi e dolomie evaporitiche e anidriti alternate a pelliti nere. Limite inferiore graduale rapido su SCI. Spessore: 0-30 m. *LADINICO SUP. (LONGOBARDICO).*

FORMAZIONE DI BUCHENSTEIN (Formazione di Livinallongo Auct.)
Unità arricitata in due lingue eteropiche a SCI. Si riconoscono: dolomie grigiastre alternate a calcari dolomitici scuri, sottili orizzonti di cineriti alterate, calcari selcirei laminati, pelli e argilliti grigie, calcari e dolomie vinaccia, livelli di pietra verde. Corpi metrici e decametrici di breccie a clasti dolomitici sono interdigitate ai sedimenti bacinali. Limite inferiore su CTR, lateralmente eteropico con SCI. Spessore: 0-80 m.
ANISICO SUP. P.P. - LADINICO INF.

FORMAZIONE DELLO SCILIAR
Dolomie peritidali di colore da grigio chiaro a bianco, organizzate in strati potenti fino al metro cui si sovrappongono sottili livelli intertidali di dolosiltiti grigio-verdastre. Si riconoscono gasteropodi, ammoniti, lamellibranchi ed alghe *Dasycladacee*. Verso l'alto dominano facies inter-sopra tidali a stromatoliti.
Litofacies di scarpata (SCI_2): è caratterizzata da bancate massicce, amalgamate e mal stratificate di dolomie bianche saccaroidi, spesso carate con frammenti di bivalvi, gasteropodi, alghe, ammoniti. Lateralmente si osservano corpi di megabrecce. Limite inferiore graduale su CTR. Limite laterale eteropico con BIL. Spessore: 300-500 m. *ANISICO SUP. – LADINICO INF.*

FORMAZIONE DI MONNA
Dolomie micritiche grigio scuro-nere laminate e dolomie nodulari grigio scuro alternate a sottili interstrati siltoso-argillari e livelli centimetrici di argilliti cora (simili/di de alternanze di cineriti). Limite inferiore netto su CTR e latcralmente eteropico con CTR. Spessore: 0-90 m. *ANISICO SUP. (ILLIRICO).*

FORMAZIONE DEL CONTRIN
Dolomie subtalisti chiare ad alghe calcaree, organizzate in strati potenti fino al metro a cui si sovrappongono sottili livelli intertidali di dolomie stromatolitiche grigio-verdastre. Nella parte alta sono presenti livelli centimetrici di argille rosse e verdastre (cineriti alterate). Presso Montagna è presente un livello decametrico di dolomie scure. Nella zona di Cortaccia presenta cordoni di eteropia con MNA. Limite inferiore netto su GIV. Spessore: 150-200 m. *ANISICO SUP. (ILLIRICO P.P.)*

FORMAZIONE DI GIOVO
Successione litologicamente eterogenea che comprende sia carbonati che depositi clastici a granulometria variabile. E' suddivisa in tre membri, due dei quali presenti nel Foglio e accorpati per esigenze grafiche. In basso, sottili livelli di argille verdi e grigie, a cui si sovrappongono livelli di biancane di dolomie e calcari grigio-giallastri micritici a noduli e selce nera. Il membro di Carbonaia è costituito da arenie e calcari siltosi grigio scuro a grigio nocciola, dolomie subtidali grigie, intercalati siltoso grigio-gallastri a sottili orizzonti emicritici bianco-rosa. A tetto è sempre riconoscibile un intervallo di 5-10 m rilel stratificato che presenta localmente tenti conglomeratiche a clasti dolomitici subangolosi o tsache di dolosiltiti laminate arrossate (Membro del Monte Ozol). Limite inferiore paraconcordante su VTG. Spessore: 20-35 m. *ANISICO MEDIO - SUP. P.P. (PESONICO - ILLIRICO).*

CONGLOMERATO DI VOLTAGO
Conglomerati medio-grossolani costituiti da clasti in prevalenza dolomitici, arrotondati (dimensioni di 0,2-15 cm), in matrice arenaceo-siltosa bianco rosata, arenarie medio-fini giallo-rosse, siltiti miscacee rosse laminate. Limite inferiore erosivo su SLI. Spessore: 15-40 m. *ANISICO MEDIO (PESONICO P.P.).*

DOLOMIA DEL SERLA INFERIORE
Dolomie gallastine con intervalli stromatolitici, orizzonti a tepee e livelli di argille rosso-verdastre. Limite inferiore netto concordante su WER$_4$. Spessore: 25-50 m. *OLENEKIANO SUP.– ANISICO INF.*

FORMAZIONE DI WERFEN
La Formazione è costituita da una complessa successione di sedimenti carbonatici, terrigeni e misti varicolori. E' suddivisa in unità di rango inferiore. Lo spessore è di 300 m. *PERMIANO SUP. P.P. – TRIASSICO INF.*

Membri di Val Badia, Cencenighe e San Lucano
Membro di San Lucano (WER$_2$): alternanze di intervalli ocilitico-bioclastici, peliti e arenarie fini giallo-rossastre, alla base. Orizzonti evaporitici giallo-rinascita con noduli e letti di gesso bianco-rosato, alternati a siltiti arenacee rosse, caratterizzano la porzione sommitale. Limite inferiore graduale rapido su WER$_3$. Spessore 40-90 m.
Membro di Cencenighe (WER$_3$): dolomie arenacee e dolomie ocilitico-bioclastiche rossastre, in banchi, spesso nodulari, di 10-100 cm, cui si alternano in subordine siltiti arenacee rosse. Limite inferiore transizionale rapido su WER$_4$. Spessore: 10-20 m.
Membro di Val Badia (WER$_4$): alternanza di calcari siltosi grigio-giallastri bioturbati con intercalazioni siltoso-marnose, calcareniti, dolomie ocilitiche gialle e rosse, siltiti e dolosiltiti varicolori. Limite inferiore transizionale rapido su WER$_5$. Spessore: 40-55 m.
Membri dell'Ostile a Gastropodi e Campil
Membro di Campil (WER$_5$): arenarie fini e siltiti rosse micacee in strati centimetrici con caratteristiche strutture da carico. Limite inferiore transizionale su WER$_6$. Spessore: 30-40 m.
Membro dell'Ostile a Gastropodi: calcari siltosi, siltiti calcaree, calcari arenacei che passano verso l'alto a calcareniti ocilitico-bioclastiche contenenti gusci di lamellibranchi e microgasteropodi. La colorazione passa dal giallastro alla base al rosso alla sommità. Il limite inferiore transizionale rapido su WER$_6$. Spessore: 10-25 m.
Membri di Andraz e Siusi
Membro di Siusi: alternanza di calcari marnosi e marnoso-siltosi giallastri, talvolta bioturbati, siltiti grigio giallastre e calcareniti ocilitico-bioclastiche da grigio-verdognole a rossastre. Orizzonti fossiliferi a Claraia. La porzione sommitale è rappresentata da un orizzonte evaporitico potente 15-20 m (dolosiltiti giallo-rossastre e siltiti varicolori). Limite inferiore netto su WER$_6$, rappresentato da un bancone di 1,5-2 m di calcareniti ocilitico-bioclastiche rossastre. Spessore: 40-55 m.
Membro di Andraz: dolomie evaporitiche, dolosiltiti giallo-rossastre vacuolari e siltiti varicolori. Limite inferiore graduale rapido su WER$_6$. Spessore: 10-15 m.

INQUADRAMENTO TETTONICO REGIONALE



MACIGNO PERMIANO

GRUPPO VULCANICO ATESINO

FORMAZIONE DI ORA
Lapilli-tuff cristallini scuri, di colore variabile dal grigio-rosso all'arancio, con rette e regolare fessurazione subverticale. Osservate costituite da abbondanti cristalli (1-4 mm) di sanidino, plagioclasi, quarzo e biotite in una pasta di fondo felsitica fluidale (grimitoti). Frequenti inclusi juvenili porfirici. Limite inferiore netto concordante o discordante su IGR e LAN. Spessore: fino a 1000 m. *PERMIANO INF. P.P.*

Membro di Predonico
Lapilli-tuff e tuff cristalli rossi caratterizzati da cristalli più piccoli e radi con abbondanti fiamme ed inclusi juvenili rossi. Alla base, discontinua presenza di **livelli vitroflrici** (ORA_2) grigio-neri ed in qua la pasta di fondo è completamente devetrificata con fessurazione perlitica e fenocristalli idiomorfi (2-5 mm) di sanidino, plagioclasi e quarzo. A luogo, sono presenti facies a blocchi. Limite inferiore netto e discordante su IGR. Spessore: fino a 250 m. *PERMIANO INF. P.P.*

FORMAZIONE DI TREGIOVO
Depositi sedimentari vulcanoclastici ben stratificati in cui si distinguono due litofacies.
Facies conglomeratica (TVG_1): conglomerati a sostegno di clasti e/o matrice con elementi vulcanici da centimetrici a decimetrici, a generale assetto non strutturato (*debris flow*). Locali intercalazioni di areniti laminate. **Facies arenitica** (TVG_2): areniti medio grossolane in strati da medi a spessi, massive e con laminazione incrociata, il colore è generalmente rosso. Occasionalmente sono presenti isolati clasti decimetrici di vulcaniti. Limite inferiore netto ed erosivo su IGR e LAN. Spessore fino a 150 m. *PERMIANO INF. P.P.*

FORMAZIONE DI ANDRIANO
Lave rioliticlie compatte da rosso arancio a rosso violaceo, con evidenti bande di flusso di spessore tra 5 e 20 cm, piano-parallele ed ondulate, con struttura porfirica a fenocristalli idiomorfi (2-5 mm) di sanidino, plagioclasi e quarzo. A luogo, sono presenti facies a blocchi. Limite inferiore netto e discordante su IGR. Spessore: fino a 250 m. *PERMIANO INF. P.P.*

FORMAZIONE DI GRIES
Lapilli-tuff rioliticl saldati, di colore rosso scuro violaceo, ad aspetto massivo o fortemente orientato. La roccia è costituita da cristalli millimetrici di sanidino, plagioclasi rosa, quarzo e biotite in pasta di fondo felsitica fluidale (grimitoti). Frequenti inclusi juvenili porfirici scuri/verdi. **Breccie vulcanoclastiche** (GSL): in parte grossolanamente stratificate, ad assetto caotico, sono presenti, a luoghi, al tetto della formazione. Sono costituite da blocchi e clasti decimetrici subangolosi ad subarrotondati, immersi in matrice microgranulare. I clasti e la matrice sono esclusivamente costituiti da frammenti della formazione originaria. Limite inferiore netto discordante su IGG. Spessore: fino a 300 m. *PERMIANO INF. P.P.*

FORMAZIONE DI GARGAZZONE
Lapilli-tuff rioclastici saldati, molto omogenei e coerenti di colore grigio-nero. La roccia è in genere nettamente suddivisa in due litofacies subverticali in lastre metriche (1-30 cm). Costituita con numerosi cristalli (1-2 mm) di plagioclasi, quarzo, biotite e pirosseno in una massa di fondo felsitica fluidale (grimitoti). Presenza di fiamme e frequenti inclusi juvenili porfirici. Limite inferiore non esposto. Spessore: almeno 100-200 m. *PERMIANO INF. P.P.*

FACIES DEI DEPOSITI QUATERNARI

a	Depositi di versante	h	Travertino
b	Depositi di versante a blocchi prevalenti	i	Till indifferenziato
b_1	Deposito di frana	k	Till di ablazione
b_2	Deposito di frana antica	l	Till di alloggiamento
b_3	Depositi di frana a grossi blocchi	l_1	Deposito di contatto glaciale
b_4	Depositi di frana a grossi blocchi antica	l_2	Deposito glacio - lacustre
SG	Deposito alluvionale o fluvioglaciale (ghiaia)	l_3	Paludi attuali
SS	Deposito alluvionale o fluvioglaciale (sabbia)	l_3LA	Deposito lacustre, palustre (argilla e limo)
SL	Deposito alluvionale o fluvioglaciale (limo)	l_3T	Deposito palustre (limo)
SGS	Deposito alluvionale o fluvioglaciale (ghiaia e sabbia)	l_3TL	Deposito palustre (limo e torba)
SSL	Deposito alluvionale o fluvioglaciale (sabbia e limo)	l_3TS	Deposito palustre (sabbia e torba)
g	Deposito di debris-flow	l_3T	Deposito palustre (torba)
I	Deposito di origine mista: di debris-flow e/o torrentizio e/o valanga	m	Deposito antropico
h_1	Deposito colluviale	n	Discarica



SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI



SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI DEL GRUPPO VULCANICO ATESINO





Copyright by ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - 2012

Progetto CARG - Legge 226/99
Direttore Responsabile: C. Campobasso
Su tal dell'istituto Geografico Militare Esercitato con atto n.100 ISPRA del 31/12/2008.
Carta Ufficiale dello Stato, tutti i diritti riservati. Riproduzione ed elaborazione riservati
(Legge n. 68 del 2.2.1960)

Foglio con Nota Illustrativa

Banca Dati,Allestimento cartografico digitale e Stampa.
LTS - Land Technology & Services Srl - Trevisi