Servizio Geologico d'Italia (2010) - *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000; F. 504 Sala Consilina*. ISPRA, Roma.
DOI: 10.15161/oar.it/211100

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II"
Polo delle Scienze e delle Tecnologie
Dipartimento di Scienze della Terra

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Scala 1:50.000

SALA CONSILINA
FOGLIO 504
della Carta 1:50000 dell'IGM

FUNZIONARIO DELEGATO PER PROGETTO CARG
per l'UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II". D. Stanzione†
COORDINATORE SCIENTIFICO. L. Sgrosso†
REDAZIONE SCIENTIFICA. M.L. Putignano†
ANALISI BIOSTRATIGRAFICHE DEI CARBONIATI. M. Parente†
ANALISI BIOSTRATIGRAFICHE PER LE UNITÀ TERRIGENE:
per IL NANNOPLANCTON CALCAREO. F.O. Amore†, A. Morabito†
per I FORAMINIFERI PLANCTONICI. V. Di Donato†
COORDINATORE PER LA BIOSTRATIGRAFIA DELLE UNITÀ TERRIGENE: F.O. Amore†

SUDDIVISIONE DEI RILEVAMENTI GEOLOGICI ALLA SCALA 1:10.000
RILEVATORE: (a) A. Ascione*, (b) M.C. Castellano*, (c) F. De Vita*, (d) V. Di Donato*, (e) M. Parente*, (f) E. Pescatore*, (g) M.L. Putignano*, (h) R. Sandulli*, (i) M. Tescione*
DIRETTORE DEL RILEVAMENTO: G. Bonardi*
Rilevamenti eseguiti negli anni 1997/2001
CONSULENTE:
PETROGRAFIA DEL CARBONIATICO: M. Tescione*; PETROGRAFIA DELLE ARENITI: M.C. Castellano*
GEOLOGIA APPLICATA: P. De Vita*; TETTONICA ED ANALISI MORFOSTRUTTURALE: M. Schiattarella*, E. Pescatore*
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO E GEOMORFOLOGIA: A. Ascione*
Collaborazione per il rilevamento dei depositi miocenici nell'area di Sanza: A. Prinzo*

Copyright by ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - 2010
Carta Ufficiale dello Stato - Legge n. 68 del 2.2.1960. Tutti i diritti di riproduzione e di rielaborazione riservati
Progetto CARG - Legge 67/88
Direttore Responsabile: L. Serva
Stampa: A.T.I. - SYSTEMCART srl - L.A.C. srl - S.EL.CA. srl - 2010
Foglio con Nota illustrativa
Banca dati ed allestimento cartografico digitale: SYSTEMCART Srl, Roma

DEPOSITI CONTINENTALI
UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI APPARTENENZA

Depositi fluviali e fluvio-torrentizi, delle golene e degli alvei attuali, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, a luoghi con presenza di blocchi anche di grandi dimensioni. **OLOCENE - ATTUALE**

Depositi di frane in evoluzione nelle aree caratterizzate dalla presenza di potenti successioni marnoso-calcaree, a luoghi con matrice limoso-argillosa. Derivanti da processi di trasporto in massa prevalentemente rotazionali e argillose delle unità dei domini interni; delle coltri di alterazione e/o detritico colluviali dei terreni del Gruppo del Cilento, dei depositi di frane anche in recenti. Talus di ambiti da attivo a sospeso a quiescente. **OLOCENE - ATTUALE**

Depositi detritici in formazione costituiti da clasti a spigoli vivi, eterometrici anche se prevalentemente grossolani, con matrice scarsa o assente in tasche e cuni. **PLEISTOCENE SUP. - ATTUALE**

Depositi di frane evolute in regimi morfoclimatici precedenti o simili a quelli attuali, costituiti da pezzame litoide eterometrico con matrice limoso-argillosa. Derivanti da processi di trasporto in massa dei terreni delle unità dei domini interni, delle coltri di alterazione e/o detritico colluviali delle unità del Gruppo del Cilento e, in subordine, del substrato non alterato. Stato di attività da attivo a sospeso a quiescente. **PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE**

Depositi colluviali argilloso-limoso-sabbiosi, bruno-rossastri, con livelli di detrito generalmente organizzato in sbne lines, a presenza di resti ceramici. **PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE**

Depositi di versante: detritico-colluviali, costituiti da alternanze di livelli di clasti grossolani con matrice limoso-sabbiosa bruno-marrone e livelli in cui la matrice prevale, formanti falde e coni alla base dei versanti. **PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE**

Depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi, a luoghi con blocchi, costituenti golene e terrazzi fluviali sospesi di pochi metri sugli alvei attuali; depositi di versante alluvionale costituiti da ghiaie eterometriche, a luoghi blocchi, con clasti generalmente ben arrotondati, con matrice limoso-sabbiosa. **PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE**

Depositi di debris flow costituiti da clasti spigolosi, eterometrici, carbonatici, con abbondante matrice sabbioso-limosa. Superficie inferiore, erosionale, data da paleovalli incise in unità terrigene interne e mioceniche; superficie superiore debolmente immorsellata, costituita da una serie terrazzate sospesa di pochi metri sugli alvei. È stata cartografata una loro origine per riedimentazione di a_3. **PLEISTOCENE SUP.**

Till indifferenziati costituiti da detrito carbonatico a spigoli vivi formante eterometrico, con matrice sabbioso carbonatica. Costituisce locali accumuli caotici di piedi dei versanti attestati sulle dorsali e della Cima di Mercoi. In appoggio su diverse unità pre-quaternarie. Superficie superiore, erosionale, a luoghi coperta da a. Deposti in ambiente glaciale. **PLEISTOCENE SUP.**

Detrito costituito da clasti spigolosi con matrice limoso-sabbiosa, stratificato e talora cementato, a luoghi blocchi di grandi dimensioni con clasti embricati. Si frequente costituisce falde alla base dei versanti stagionali e talora accumuli sui livelli di base locali, a luoghi ruzzolati fino a grandissime distanze che, in qualche caso, hanno provocato l'allontanamento dei pendii alimentatori. Superficie superiore, erosionale, talora separata da b_2 e/o a. grado di conservazione delle forme molto variabile. **PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUP.**

Conglomerati, a luoghi ghiaie, costituiti da clasti carbonatici frequentemente subarrotondati e ben classati, con matrice carbonatica, stratificati, di conoide alluvionale. Sono distacati dal fagile. Poggiano su diverse unità pre-quaternarie; superficie superiore erosionale; le forme presentano un variabile grado di conservazione; risultano sospesi, anche fortemente, su livelli di base locali. **PLEISTOCENE INF? - PLEISTOCENE MEDIO**

Breccie in genere stratificate, costituite da detrito carbonatico grossolano e spigolioso con matrice limo-sabbiosa carbonatica biancastra o rosata; costituiscono placche lungo i versanti carbonatici o su ripiani erosionali sospesi anche di centinaia di metri sui livelli di base locali, o accumuli non più in rapporto con i pendii alimentatori, con giaciture variabili. Superficie superiore, erosionale, talora sepolta da b_2 e/o a. **PLEISTOCENE INF. - PLEISTOCENE MEDIO**

Coltri eluvio-colluviali costituite da suoli residuali, terre rosse, e paleosuoli con clasti insolubili, incorporati il fondo di doline e campi carsici. **PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE**

SINTEMA DEL F. FIUMICELLO

TFN — Conglomerati e ghiaie, con grandi blocchi, e matrice sabbioso-ghiaiosa subordinata; con clasti ben arrotondati, in prevalenza arenaceo-conglomeratici. La litologia e la tessitura indicano un'origine per relaborazione e selezione idraulica dei depositi di RDF. Poggiano, su superficie erosionale, su diverse unità pre-quaternarie; superficie superiore, erosionale, a luoghi marcata da intensa alterazione; dissecati e sospesi sui livelli di base locali, di scitto a costituire conali.
PLEISTOCENE INF?

SINTEMA DI MONTE VIVO

BVV — Breccie costituite da detrito carbonatico grossolano, si rinvengono intorno a 1000 m di quota, dove si raccordano ai paesaggi erosionali (Paleosuperfici Auct.) e/o ai versanti strutturali. Poggiano su diverse unità del Gruppo del Cilento, mesozoiche e terziarie alimentatori, le giaciture sono variabili, risultano dislocate da faglie a movimento gravitativi. Poggiano su diverse unità mesozoico-terziarie; superficie superiore, erosionale, a luoghi sepolta da RDF.
PLIOCENE SUP.

SINTEMA DI ROFRANO

RDF — Depositi detritici costituiti da clasti molto eterometrici, fino a alcuni metri cubi, con matrice da sabbiosa grossolana a siltosa, a luoghi cementati. Clasti arenaceo-conglomeratici con disposizione in prevalenza caotica; la litologia denuncia una alimentazione da SRO e dalle unità appartenenti al Gruppo del Cilento, messi in posto entro paleovalli per processi di trasporto in massa. Poggiano su diverse unità del Gruppo del Cilento, del Flysch Rosso e delle Argille Varicolori; superficie superiore, erosionale, a luoghi marcata da intensa alterazione rosso-arancio e sepolta da b_2 e a. Affiorano fortemente sospesi sui livelli di base locali, spesso a costituire conali. Corrispondono a Conglomerati di Centola Auct.
PLIOCENE

UNITÀ DISTINTE IN BASE AL BACINO DI APPARTENENZA

BACINO DI SANZA - VALLE DEL FIUME BUSSENTO

SINTEMA DEL FIUME BUSSENTO

Include depositi alluvionali e coni alluvio-colluviali affioranti nell'alto bacino del Fiume Bussento e nel bacino di Sanza. Superficie inferiore erosionale, modellata su diverse unità pre-quaternarie e su b_2/D; superficie superiore coincidente con la superficie topografica, sotto a luoghi coperta da b_2. Suddivisa in subsintemi.
PLEISTOCENE MEDIO - ATTUALE

LSBa — Subsintema di Sanza
Depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi occupanti i fondivalle e costituenti i terrazzi che si elevano di pochi metri sugli alvei attuali. Superficie superiore coincidente con la superficie topografica, a luoghi con debole alterazione mentre sabbioso-limosa; a luoghi presentano tipici caratteri a luoghi con terreni rossi e depositi alluvio-colluviali, costituenti il riempimento di campi carsici attivi (ba). Superficie inferiore erosionale, modellata su diverse unità pre-quaternarie e su LSBb; superficie superiore coincidente con quella del sintema che lo include.
PLEISTOCENE SUP. - ATTUALE

LSBb — Subsintema del Vallone Secco
Conglomerati di conoide alluvionale con matrice arenacea, a luoghi ghiaie, costituiti da clasti subarrotondati, da eterometrici a ben classati, stratificati. Affiorano lungo il versante sud-est a sospeso (fino a 30 m) sui livelli di base locali. Superficie inferiore coincidente con quella del sintema che lo include; superficie superiore, erosionale, a luoghi coincide con la superficie topografica, a luoghi sepolta da LSBa, b_2 e a.
PLEISTOCENE MEDIO

BACINO DEL VALLO DI DIANO

SUPERSINTEMA DEL VALLO DI DIANO

Include depositi lacustri e alluvionali presenti in affioramento e nel sottosuolo del bacino del Vallo di Diano. Superficie inferiore erosionale, modellata su diverse unità pre-quaternarie; superficie superiore, solo a luoghi coperta da b_2 e a, coincide quasi ovunque con la superficie topografica. Suddiviso in sintemi.
PLEISTOCENE INFERIORE? - OLOCENE

SINTEMA DELLA CERTOSA DI PADULA

PADa — Depositi lacustri costituiti da alternanze di argille grigie e nerastre, limi marroni e, a luoghi, torbe (d2); in etensja a depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi fluviali e a depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie a clasti eterometrici, ben arrotondati, con matrice sabbioso-limosa a luoghi fravertinie (b). In appoggio, su diverse unità pre-quaternarie e su PADb; superficie superiore, a luoghi coincidente con la superficie topografica, a luoghi del supersintema che lo include. Età radiocarbonico delle argille carotate, a -20 m, >49ky a, a -10 m, 17 ky.
PLEISTOCENE MEDIO p_{p}. - OLOCENE

SINTEMA DI BUONABITACOLO

BUOa — Depositi lacustri costituiti da argille grigie con livelli prossitestici e di molluschi dulcicoli e ostracodi, a luoghi alternati a livelli sabbiosi e lenti di ghiaie fluviali (d2); affiorano a sospeso di conoide alluvionale e in sottosuolo fluviali, costituiti da conglomerati e ghiaie a clasti centimetrici/decimetrici poligenici ben arrotondati con matrice sabbiosa e intercalazioni di lenti di sabbie e limi (b). Affiorano terrazzati e, a luoghi, debolmente inclinati, nella zona sud del Vallo e, nella zona orientale, sollevati da faglie fino a circa 700 m; si rinvengono nel sottosuolo fino a 200 m di profondità. Superficie inferiore erosionale, modellata su diverse unità pre-quaternarie che lo include; superficie superiore erosionale, a luoghi sepolta da PAD, b_2 e a, a luoghi data da forme terrazzate marcate da intense alterazione. Età ^{14}C delle argille carotate a -140 m, 596 t-6 ky.
PLEISTOCENE INF? - MEDIO p_{p}.

BUOb — Depositi lacustri costituiti da argille grigie con livelli prossitestici e di molluschi dulcicoli e ostracodi, a luoghi alternati a livelli sabbiosi e lenti di ghiaie fluviali (d2); affiorano a sospeso di conoide alluvionale e in sottosuolo fluviali, costituiti da conglomerati e ghiaie a clasti centimetrici/decimetrici poligenici ben arrotondati con matrice sabbiosa e intercalazioni di lenti di sabbie e limi (b). Affiorano terrazzati e, a luoghi, debolmente inclinati, nella zona sud del Vallo e, nella zona orientale, sollevati da faglie fino a circa 700 m; si rinvengono nel sottosuolo fino a 200 m di profondità. Superficie inferiore erosionale, modellata su diverse unità pre-quaternarie che lo include; superficie superiore erosionale, a luoghi sepolta da PAD, b_2 e a, a luoghi data da forme terrazzate marcate da intense alterazione. Età ^{14}C delle argille carotate a -140 m, 596 t-6 ky.
PLEISTOCENE INF? - MEDIO p_{p}.

UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE SIN E POST-ORogENE

FORMAZIONE DI CASTELVETERE

CVT — Arenarie torbiditiche grossolane talora con base microconglomeratica a composizione feldspatico-litica, in strati da medi a spessi, tendenzialmente con base erosiva; frequenti le amalgamazioni. Alla base degli strati talora clasti di argille verdi; A/P >>1. Spessore stratigrafico ottimo sintetico 150 m. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare, con CRQ.
TORTONIANO SUP. - MESSINIANO INF. (da letteratura)

FORMAZIONE DI M. SIERRO

SIE — Calcareniti a bioclasti, torbiditiche grige, litio-bioclastiche con macroforaminiferi, in strati medi a spessi talora con inclusi marnosi. Intercalazioni di calcari marnosi e calciluti grige, marne calcaree grige tabacco, marne argillose grige e arenarie torbiditiche grossolane a cemento calcitico con granuli di quarzo arrotondato e livelli di argille, tendente arenarie litiche biancastre. Brecce bioclastiche lentiformi in marne bioclastica a macroforaminiferi. Spessore stratigrafico in affioramento di poche decine di metri. Limite inferiore non visibile in affioramento.
TORTONIANO SUP (da letteratura)

CALCIRUDITI ED ARENARIE DI PIAGGINE

PGN — Unità torbiditiche gallerie grossolane e microconglomeratiche, subordinatamente fini, in strati spessi e molto spessi lenticolari a da sottili a medi, tipo TS5 tabulari, alternate ad argille rossastre e calcareniti biancastre, in strati da sottili a medi, lenticolari; base erosiva, A/P generalmente >>1. Spessore massimo 40 m. Limite superiore tettonico con GSD, ALV e PMS. Limite inferiore erosivo e con discordanza angolare con BIF, netto con PGN; talora marcato da livelli di slumps e elementi intra- ed extraformazionali.
TORTONIANO INF.

PGNa — **membro pelitico-arenaceo (PGNa)**
Torbiditi pelitico-arenacee in strati sottili, tipo TS7 e spessi, tabulari, fini e medie, argille siltose brune e verdastre. A/P variabile da << a circa 1. Talora marne e calciluti marrone chiaro, laminate, tabulari e lenticolari, in strati da sottili a medi, lenticolari; debole flusw a elementi intra- ed extraformazionali. Spessore massimo 150 m. Limite superiore tettonico con ALV. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare, con TRN e RDT, parzialmente sovrapposto con PGNb.
TORTONIANO SUP.

PGNb — **membro calciruditico (PGNb)**
Calciruditi mal stratificate e lenticolari, con clasti subarrotondati e a spigoli vivi, da centimetrici a centinaia di m/l, eccezionalmente di centinaia di migliaia di m/l, provenienti da RDT e TRN, in subordine da FCE, BIF, in scarsa matrice siltoso-arenitica a cemento calcitico. Spessore da 0 a 70 m. Limite superiore tettonico con TRC, ALV e SCE. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare con BIF, FCE, TRN e CRQ.
TORTONIANO SUP.

SRO — **FORMAZIONE DI MONTE SACRO**
Arenarie torbiditiche grossolane prevalenti con clasti extrabacinali da subarrotondati ad arrotondati di rocce cristalline e sedimentarie, rari clasti intraformazionali argillosi grigio-verdastri, in strati molto spessi, fino a decametrici con base erosiva, lenticolari, generalmente amalgamati. Spessore stimato 500 m. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare, con MAQ.
post TORTONIANO INF. (per posizione stratigrafica)

GRUPPO DEL CILENTO

Comprende tre formazioni torbiditiche tra di loro parzialmente eteropiche.
BURDIGALIANO MEDIO (MNN4) - TORTONIANO INF. (da letteratura)

FORMAZIONE DI SAN MAURO

MAQ — Unità torbiditica arenitico-pelitica e marnoso-calcarenitica con frequenti intervalli conglomeratici e con orizzonti guida costituiti da strati marnosi e depositi caotici, suddividibile in membri.
LANGHIANO - TORTONIANO INF.

membro di Isca di Masi (MAQ$_1$)
Arenarie torbiditiche grossolane talora con base conglomeratica in strati da spessi a molto spessi, piurimetrici, talora amalgamati, tabulari. A/P >>1; subordinatamente microconglomerati e conglomerati poligenici in strati da spessi a molto spessi, tabulari, a base erosiva, con clasti da centimetrici a decimetrici, ben arrotondati di cristalline e sedimentarie. Nella porzione inferiore e media comprende diversi orizzonti guida di cui caratteristici bli, b_2, bli. Spessore da 400 a 900 m. Limite inferiore netto con MAQ$_2$.
LANGHIANO (per posizione stratigrafica) **- TORTONIANO INF.** (da letteratura)

olistostroma superiore (bs)
argille-marnose grige, verdi e rossastre a tessitura caotica inglobanti clasti poligenici eterometrici sino ad alcuni decimetri cubi, di rocce cristalline e sedimentarie. Localmente, pacchi di strati disarticolati e contorti di arenarie torbiditiche e di calcareniti e calciruditi a cemento calcitico. Si intrude intraformazionali. Sono presenti olistoliti anche di rocce ofiolitiche: lave a cuscino e laccioliti (k), gabbri (gb), rocce silicee (sc). Spessore 80-100 m, in contatto erosivo con i depositi arenacei tr$_3$.
SERRAVALLIANO SUP (da letteratura)

strato di S. Mango (foglianna superiore) ($_5$)
megastrato calcilutitico-marnoso e marnoso grigio cinerino e biancastro, con base calcarenitica. Spessore da 0 a 100 m, presente al disotto di $_4$, in contatto netto con i depositi arenacei.
SERRAVALLIANO SUP (da letteratura)

olistostroma inferiore (bi)
peliti grigio-verde-rossastre a tessitura caotica inglobanti clasti poligenici arrotondati di rocce cristalline e sedimentarie, di dimensioni inferiori al decimetro cubo. Talora si rinvenuto pacchi di strati intraformazionali arenaceo disarticolati e contorti. Spessore da 0 a 80 m. In contatto erosivo con i depositi arenacei e con PLL.
LANGHIANO (da letteratura)

membro del vallone Cupolo stretto (MAL$_1$)
Arenarie litiche fini e siltiti torbiditiche, grigio-giallastre e subordinatamente pelliti, in strati medi e sottili. A/P ≥ 1. Frequenti intercalazioni di strati da spessi a molto spessi fino a decametrici di marne calcaree e calciluti biancastre, laminate. Spessore variabile da 60 a 500 m. Limite inferiore netto con PLL.
LANGHIANO (da letteratura)

ARENARIE DI POLLICA

PLL — Torbiditi arenaceo-pelitiche marroni a granulometria da medio-fini a molto grossolane e microconglomeratiche in strati da medi a spessi tabulari, con sottili intercalazioni pelitiche e carbonatiche ocra. Con frammenti di materiale organico nerastro. A/P da << a >>1. Nella parte basale diurnici e debriti flow. Spessore da 180 a 470 m. Comprende un membro basale (PLL$_1$), ed una litofacies (PLL$_2$). Limite inferiore a luoghi erosivo e basa con discordanza angolare con PLL$_1$, a luoghi netto con discordanza angolare con TNC e SCE, tettonico con BIF.
BURDIGALIANO MEDIO (MNN4) - LANGHIANO (da letteratura)

membro arenaceo-pelitico basale (PLL$_1$)
Torbiditi arenaceo-pelitiche grigio-azzurro da grossolane a fini, litiche ed arcosiche e pelliti grigio-piombo e marrone in strati medi e fini tabulari, talora lenticolari. Frequenti verso la base di calcite spatica biancastra nelle areniti. A/P >1 talora << 1. Nella parte alta, argille siltose grigio-piombo e tessitura caotica inglobanti blocchi e pacchi di strati disarticolati intra- ed extraformazionali, provenienti dal membro sommitale. Spessore da 0 a 200 m. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare, con PLL$_2$. Spessore geometrico stimato 350 m. Limite inferiore erosivo e con discordanza angolare con TNC e SCE, tettonico con BIF.
BURDIGALIANO (per posizione stratigrafica)

litofacies di Postiporta (PLL$_2$)
Torbiditi arenaceo-pelitiche, costituite da arenarie fini in strati sottili, tipo TS7. A/P circa>1. Rare intercalazioni carbonatiche, ocra a grigio-argento in strati sottili. Spessore geometrico stimato da 0 a 100 m. A luoghi al tetto di PLL$_1$. Limite inferiore erosivo e con discordanza angolare con PNL e SCE.

FORMAZIONE DI ALBOGNA

ABG — Torbiditi arenaceo-pelitiche e arenaceo-conglomeratiche. Le torbiditi arenacee da grossolane a medio-fini a composizione arcosico-litica, si rinvenuto in strati da medi a spessi talora molto spessi a geometria tabulare. A/P variabile generalmente maggiore di 1. Si intercalano torbiditi marnose grigio chiare laminate, talora con base calcarenitica, in strati molto spessi, tabulari, talora costituiscono banchi plurimetrici, con base calcarenitica. Spessore stratigrafico in affioramento difficilmente valutabile, presumibilmente non superiore a 1000 m. Limite inferiore tettonico con tutte le unità precedenti.
LANGHIANO - TORTONIANO INF. (da letteratura)

OLISTOLITI presenti in gli costituiti dalle seguenti litologie:
rocce ofiolitiche: lave a cuscino e laccioliti (k),
gabbri (gb),
rocce silicee (sc)

UNITÀ TETTONICA CASTELNUOVO CILENTO
(ex Complesso ed Affioraà Nicodemo Auct.)

ARENARIE DI PIANELLI

PNL — Torbiditi arenaceo-pelitiche nocciola in strati da sottili a medi tipo TST, tabulari; a granulometria fine, raramente medie ricche in quarzo e mica. Le pelliti grige e rossastre sono siltose talora marnose. Presenti argilliti nerastre siliciose a rare intercalazioni di torbiditi carbonatiche. Frequenti paleo mangaresifere. A/P variabile da << 1 a >1. Spessore geometrico circa 100 m. Limite superiore erosivo, con discordanza angolare, con PLL$_{1-2}$. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare, con TNC.
BURDIGALIANO (NF. per posizione stratigrafica)

MARNE E CALCARENITI DEL TORRENTE TRENICO

TNC — Torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee grigio verdastro con patine di manganese brunastre e rossastre in strati da sottili a medi, tipo TS6 tabulari, a base netta. Le marne sono siltose e argillose, a luoghi con impregnazioni manganesifere da violacee a rosso cupone, talora alternate a calciluti nerastre. A/P da > a c.1. Spessore geometrico circa 400 m. Limite superiore erosivo e con discordanza angolare con PLL. Limite inferiore per alternanza con GSD, tettonico con ALV, SCE, PGN, e BIF.
OLIGOCENE TERMINALE/MIOCENE INF. - BURDIGALIANO (da letteratura)

ARGILLITI DI GENESIO

GSO — Argilliti scagliose e marne argillose ocra e marrone scuro talora policrome, alternate a torbiditi siltiche ed arenaceo-micacee a granulometria fine e a calciluti nerastre con vene di calcite a patine manganesifere. A/P <<1. Frequenti vene di calcite intersticiali. Spesore geometrico circa 300 m. Limite inferiore tettonico con ALV, FMS e PGNb.
BARTONIANO - OLIGOCENE TERMINALE/MIOCENE INF. (da letteratura)

UNITÀ TETTONICA SICILIDE DELLA VALLE DEL CALORE

ARENARIE DI ALBANELLA

ABA — Arenarie torbiditiche da medio-grossolane a conglomeratiche, quarzoso-litiche talora con granuli di quarzo arrotondato, in strati da medi a molto spessi, con base erosiva, lenticolari, di frequente amalgamati. A/P >>1. Alternate a torbiditi calcareo-marnose, talora con base calcarenitica in strati da spessi a molto spessi tabulari o piurimetrici, tabulari. Spessore geometrico circa 250 m. Limite inferiore tettonizzato con ALV, tettonico con RDT.
BURDIGALIANO INF. (per posizione stratigrafica)

GRUPPO DELLE ARGILLE VARIEGATE (av)

ARGILLE VARICOLORI SUPERIORI (ch: argille varicolori di Tempa Rotonda)

ALV$_a$ ALV — Argille ed argilliti prevalentemente grigio-piombo con intervalli rosso scuro e verdi a struttura caotica, intercalate a torbiditi calcaree-marnose avana e talora verdastre, in strati da sottili a medi, tabulari, di rado con deformazioni convenute, generalmente in clasti e boudins. Frequenti vene di calcite. Spessore geometrico affiorante da alcune decine fino a 400 m. Comprende una litofacies presente nella parte alta (ALV$_a$). Limite inferiore tettonico con PGN, BIF, FCE, RDT, tettonizzato e/o erosivo netto con PMS, tettonico con i depositi di PGN, BIF e RDT. Con quest ultimi talora il contatto avviene mediante l'interposizione di una ampia zona di taglio.
OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF. (da letteratura)

litofacies del Vallone del Frocchio (ROU)
Argille marnose e scagliettate marroni; intercalate a calciruditi e marne grige e marroni con patine di alterazione giallo avana in strati da medi a spessi talora molto spessi; frequenti impregnazioni manganesifere. Nella parte alta spesso intervalli di argilliti rosso scuro. Spessore geometrico affiorante circa 200 m. Limite inferiore tettonico con ALV, FMS e PGNb.
OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF. (da letteratura)

FORMAZIONE DI MONTE SANT'ARCANGELO

FMS — Argilliti grigio scuro, con livelli rosso scuro e verdastri e marne bancarelle a grige in strati da sottili a medi; marnosi e limi grigio-verdastri, biancastri, in strati da sottili a medi, tabulari. Alla base degli strati marne a tessitura caotica (MAQ$_{ch}$). Frequenti vene di calcite intersticiali. Nella parte alta vene distinte una litofacies caratterizzata da intervalli di argilliti rosso scuro. Spessore affiorante circa 600. Limite inferiore tettonico con RDT.
BURDIGALIANO SUP. (NF16) - MIOCENE INF. (MNN1c).

litofacies marnoso-calcarea (FMS$_a$)
Torbiditi marnoso-calcaree, con base calcarenitica e calciruditica, in strati da medi a spessi talora molto spessi, tabulari con frequenti liste e noduli di selce, alternate a marne scagliose biancastre, talora rosate e verdastre, e ad argille verdi e rosse. Si intercalano brecciole carbonatiche bancarelle con filo-bioclasti e clasti di argille verdi, in strati medi a spessi, talora lenticolari. Spessore geometrico affiorante circa 70 m. Limite inferiore tettonico con PGN, BIF e FCE.
CRUTTIANO (NF24) - MIOCENE INF. (MNN1c).

OLISTOLITI:
Nella parte alta di ALV sono inglobati blocchi di calcari a rudiste del Cretacico superiore, e debris flows carbonatici in scarsa matrice carbonatica con cortoli calcaree di età compresa tra il Giurassico e Cretacico superiore (bS).

UNITÀ TETTONICA NORD-CALABRESE

FORMAZIONE DEL SARACENO

SCE — Calcareniti, calcareniti e calciruditi torbiditiche nerastre in strati da medi a spessi tabulari, alternate a livelli di marne calcaree scagliose grigio-nerastre a fucoidi, e da arenarie fini e siltiti. A/P generalmente << 1 talora >>1. Frequenti vene di calcite, liste e noduli di selce. Spessore geometrico affiorante non superiore a 400 m. Limite superiore erosivo, con discordanza angolare con PLL$_2$, PLL$_3$ e PLL, tettonico con PNL, TNC, ALV, PGN, e BIF. Talora a luoghi è presente un intervallo di transizione di una ampia zona di taglio.
OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF. (da letteratura)

UNITÀ TETTONICA ALBURNO-CERVATI-POLLINO

FORMAZIONE DEL BIFURTO

BIF — Torbiditi arenaceo-pelitiche rossastre quarzoarenitiche, con grani di quarzo arrotondato, a cemento siliceo, in strati da sottili a spessi, tabulari; A/P da << a >>1. Intercalati livelli spessi di argille grigio tabacco, e verdastre con venature azzurrognole, bioclastoruditi a macroforaminiferi in strati medi, lenticolari, calciruditi spongolitiche grige in strati da medi a spessi, lenticolari. Spessore massimo 200 m. Limite inferiore erosivo, con discordanza angolare con PGN, tettonico con PNL, TNC, ALV, PMS, e SCE, talora mediante l'interposizione di una zona di taglio. Limite inferiore discordanza concordante con FCE spesso tettonizzato.
BURDIGALIANO (MNN4a) - SERRAVALLIANO/LANGHIANO (Zona MNN5b)

FORMAZIONE DI CERCHIARA

FCE — Calcareniti e in subordine calciruditi grigio giallognole in strati medi e spessi con macroforaminiferi e talora con granuli glauconitici. Alla base strati lentiformi e discontinui ricchi di ciottoli e pectiniti e di marne giallognole e verdastre. Tra i macroforaminiferi Miogypsina spp., Operculina spp. Spesso affiorante da pochi metri a 12 metri. Limite inferiore discordanza concordante con TRN, a luoghi con l'interposizione di ALR.
AQUITANIANO - BURDIGALIANO


Roscigno
Postiglione
Sicignano degli Alburni
Petina
Polla
Auletta
Pertosa
Caggiano
Sala Consilina
Padula
Buonabitacolo
Casalbuono
Montesano sulla Marcellana
Teggiano
Monte Cervati
Monte Motta
Monte Sacro
Monte Centaurino
Monte Rosole
Monte Cavallaro
Monte Cerasuolo
Monte Cerasuolo
Monte Cerasuolo