FOGLIO 471 IRSINA

Servizio Geologico d'Italia (2017) - *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, F. 471 Irsina*. ISPRA, Roma.
DOI: 10.15161/oar.it/212413

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Organo Cartografico dello Stato (legge n° 68 del 2.2.1960)

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Foto: volo regionale geologico - 1 : 10.000

REGIONE BASILICATA

IRSINA
FOGLIO 471

della Carta 1:50.000 dell'I.G.M.

RESPONSABILE DEL PROGETTO CARG PER LA REGIONE BASILICATA: B. Anzidei[1]
COORDINATORE SCIENTIFICO: P. Pieri[2].
DIRETTORE DI RILEVAMENTO: F. Boenzi[2].

1 - Dipartimento Ambiente, Territorio, delle Politiche della Sostenibilità, Regione Basilicata;
2 - Dipartimento di Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; Bari;
3 - CNR- IBAM, Tito Scalo (PZ);
4 - Geologo libero professionista.

SUDDIVISIONE DEI RILEVAMENTI GEOLOGICI ALLA SCALA 1:25000
RILEVATORI ESPERTI: m/S. Gallicchio*, m/L. Sabato*, m/ M. Tropeano[2],
RILEVATORI: m/M.Lazzari[3], m/ R. V. Petrocelli[4], m/ G. Vitale*
ANALISI BIOSTRATIGRAFICHE: M. Marino[2]

Rilevamenti eseguiti negli anni: 1996 - 2001



Copyright by ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - 2017

Dal foglio dell'Istituto Geografico Militare (Autorizzazione IGM n° 5005 del 07-03-2005)
Carta Ufficiale dello Stato - Legge n. 68 del 2.2.1960. Tutti i diritti di riproduzione e di elaborazione riservati

Progetto CARG - Legge 67/88

Direttore Responsabile: C. Campobasso

Pleistocene sup.-Olocene

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI
UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI PERTINENZA

Deposito di versante — a
Terreni eterometrici costituiti da clasti grossolani e blocchi a spigoli vivi, a luoghi cementati, immersi in una matrice sabbioso-limosa, che localmente assumono un colore rossastro; lo spessore è di pochi metri.
OLOCENE

Deposito di frana — a_{fq}
Terreni caotici costituiti da litotipi eterogenei ed eterometrici (da granuli a blocchi), inglobati in matrice argilloso-sabbiosa.
OLOCENE

Deposito alluvionale — a_a
Sedimenti conglomeratico poligenici ed eterometrici e sabbioso conglomeratici con matrice limosa ed intercalazioni di lenti sabbioso-limose. Essi costituiscono gli attuali letti dei corsi d'acqua prevalentemente di tipo *braided* e a luoghi formano conoidi alluvionali. Lo spessore è di ordine decametrico.
OLOCENE

Deposito di frana antica — a_{fa}
Terreni caotici costituiti da litotipi eterogenei ed eterometrici (da granuli a blocchi), inglobati in matrice argilloso-sabbiosa, a luoghi pedogenizzati ed interessati da fenomeni di erosione. Depositi attualmente stabilizzati.
PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE

Deposito alluvionale recente — a_b
Sedimenti sabbioso-ghiaiosi e subordinatamente sabbioso-limosi con intercalazioni di lenti conglomeratiche. Tali depositi presentano facies di piana di esondazione nei corsi d'acqua di tipo *braided* e a luoghi di conoide alluvionale. Lo spessore affiorante varia fino a un massimo di 10 metri.
PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE

Coltre eluvio-colluviale — b_2
Depositi siltoso-argillosi, sabbiosi e sabbioso-limosi rossastri con intercalazioni ghiaiose. Lo spessore è di qualche metro. Frequentemente, nell'area bradanica, tale coltre copre spesso depositi di frana.
PLEISTOCENE SUP.

DEPOSITI ALLUVIONALI DISTINTI PER BACINO DI PERTINENZA

SUPERSINTEMA DEL TORRENTE BASENTELLO (BS)

Tale supersintema è rappresentato da depositi prevalentemente ghiaiosi costituenti tre sintemi delimitati alla loro base da superfici di erosione quasi orizzontali, incise nelle argille. I depositi di tale supersintema, per i loro caratteri tessiturali, possono essere riferiti a piane alluvionali di conoidi a carattere prevalentemente torrentizio.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI MASSERIA MANGIARIDDO — MID
Depositi prevalentemente conglomeratici affioranti fra 205 e 220 metri di quota; lo spessore è di pochi metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI CAPOLAZZO — CPZ
Depositi prevalentemente conglomeratici affioranti fra 225 e 235 metri di quota; lo spessore è di pochi metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI MASSERIA CAPOLAZZO — MCL
Depositi prevalentemente conglomeratici affioranti fra 245 e 260 metri di quota; lo spessore è di pochi metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SUPERSINTEMA DEL TORRENTE BILOSO (BL)

Tale supersintema è formato da sedimenti che costituiscono due sintemi rappresentati da conglomerati con matrice sabbiosa. Tali sintemi sono delimitati alla loro base da superfici di erosione; per i loro caratteri sedimentari i depositi che li costituiscono possono essere riferiti a corsi d'acqua di tipo *braided*. A luoghi verso l'alto, i depositi mostrano caratteri di piana di esondazione.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.?

SINTEMA DI MASSERIA MONTELEONE — NTL
Depositi conglomeratico sabbiosi affioranti fra 240 e 400 metri di quota; lo spessore è di pochi metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI MASSERIA CASALIGNO — MCG
Depositi conglomeratico sabbiosi affioranti fra 280 e 430 metri di quota; lo spessore è di pochi metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SUPERSINTEMA DEL FIUME BRADANO (BD)

Tale supersintema è rappresentato da quattro sintemi delimitati in basso da superfici erosionali corrispondenti a superfici di erosione. Tali sintemi sono formati da sedimenti sabbioso-conglomeratici che a luoghi, mal affioranti, a causa di intensa attività antropica. Per i loro caratteri tessiturali, possono essere riferiti a piane alluvionali di conoi d'acqua di tipo *braided* o a conoidi alluvionali.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI POZZA CHIARELLA — PZC
Depositi sabbioso-conglomeratici e conglomeratici, spesso ascrivibili a lembi di conoide, affioranti fra 218 a 384 metri di quota; lo spessore è di circa 10 metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI TORRE D'OPPIDO — TPD
Depositi conglomeratici, conglomeratico-sabbiosi, sabbioso-conglomeratici e siltoso-conglomeratici riferibili a piane alluvionali e a luoghi a conoide alluvionale. Frequentemente risultano mal affioranti a causa di intensa attività antropica. Tali depositi affiorano fra 265 e 440 metri di quota e mostrano uno spessore variabile fino ad un massimo di 15 metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI PIANA LA COLONNA — PLC
Depositi conglomeratico, conglomeratico-sabbiosi, sabbioso-conglomeratici e siltoso-sabbiosi spesso mal affioranti a causa di intensa attività antropica. Tali depositi affiorano fra 310 e 380 metri di quota e mostrano uno spessore di circa 10 metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI MASSERIA BECCE — MSC
Depositi conglomeratico-sabbiosi affioranti in lembi a causa di intensa attività antropica. Tali depositi affiorano fra 382 e 469 metri di quota e mostrano uno spessore di circa 10 metri.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SUPERSINTEMA DEL FIUME BASENTO (BT)

Tale supersintema è costituito da quattro sintemi di natura prevalentemente sabbioso-conglomeratica delimitati in basso da superfici di erosione quasi orizzontali. Questi sintemi sono costituiti nella parte bassa prevalentemente da conglomerati con caratteri di conoi d'acqua di tipo *braided*, e nella parte alta da sedimenti sabbioso-siltosi con caratteri riferibili a piane di esondazione.
PLEISTOCENE MEDIO - SUP.

SINTEMA DI MASSERIA LINZALATA — SLZ
Depositi sabbioso-conglomeratici affioranti fra 202 e 318 metri di quota; lo spessore medio è di circa 2-3 metri.
PLEISTOCENE SUP. p.p. (parte alta?)

SINTEMA DI MASSERIA DECUZZI — MDZ
Depositi conglomeratico sabbiosi affioranti fra 260 e 320 metri di quota; lo spessore è di circa 7-8 metri.
PLEISTOCENE SUP. p.p. (parte bassa?)

SINTEMA DI PIANO FOCACCIA-MASSERIA ORLANDI — PFC
Depositi conglomeratici e sabbiosi affioranti fra 300 e 340 metri di quota; lo spessore è di circa 10 metri.
PLEISTOCENE MEDIO p.p. (parte alta?)

SINTEMA DI SERRAVUZZO — RVZ
Depositi conglomeratico sabbioso affioranti fra 370 e 390 metri di quota; lo spessore è di circa 10 metri.
PLEISTOCENE MEDIO p.p. (parte bassa?)

DEPOSITI ALLUVIONALI NON ATTRIBUIBILI AGLI ATTUALI BACINI IDROGRAFICI

Si tratta di depositi continentali conglomeratici e sabbiosi per i quali non è possibile risalire al bacino idrografico di appartenenza, e che giacciono in netta discordanza, per mezzo di una superficie di erosione, sui sottostanti depositi appartenenti all'Unità della Fossa bradanica. Sulla base del riconoscimento di superfici di discontinuità, si distinguono due sintemi, delimitati alla loro base da superfici di erosione, che affiorano nella zona di Santa Maria d'Irsi. In base a considerazioni di carattere regionale, ed in base a dati di letteratura (Sasso, 1996; Pieri et alii, 1997), l'età di tali depositi può essere riferita complessivamente al *PLEISTOCENE INF. - MEDIO (?)*.

SINTEMA DI MASSERIA DIRISI — SMS
Depositi conglomeratico e sabbioso-limoso, frequentemente disorganizzati e posti a quote elevate rispetto all'attuale livello di base, e spesso in posizione di spartiacque. Sono riferibili a parziale rimpiombamento di paleoincisioni e paleoconoidi in erosione sia sulle argille subappennine, sia sulla formazione di Monte San Marco, sia sul sintema di Ponte dell'Acqua. Lo spessore varia fino a un massimo di circa 10 metri.
PLEISTOCENE INF. - MEDIO (?)

SINTEMA DI FOSSO MACELLO — SFM
Depositi sabbioso ed ghiaiose di colore rossastro estremamente discontinui, poggiano in discordanza sia sui termini sabbiosi e sabbioso-conglomeratici che sulle lenti conglomeratiche della formazione di Monte San Marco per mezzo di superfici di erosione molto irregolari e frequentemente a base canalizzata. L'ambiente è riferibile a sistemi alluvionali o retrodunali. Lo spessore è molto variabile, fino a un massimo di oltre 10 metri.
PLEISTOCENE INF. - MEDIO (?)

SINTEMA DI PONTE DELL'ACQUA — PCQ
Conglomerati grossolani poligenici ed eterometrici con matrice sabbioso-limosa di colore rossastro, in contatto erosivo e discordante sia sui conglomerati di Serra del Cedro che sulle argille subappennine. I caratteri di facies di tali depositi sono riferibili ad un sistema di conoide alluvionale; lo spessore raggiunge un massimo di circa 150 metri.
PLEISTOCENE INF. - MEDIO (?)

Pliocene sup.-Pleistocene inf.

DEPOSITI MARINI PLIOCENICI E QUATERNARI
UNITÀ DELLA FOSSA BRADANICA

FORMAZIONE DI MONTE SAN MARCO — SBC_{MTM}, SBC
Alternanza di sabbie e arenarie passanti a luoghi verso l'alto a conglomerati. Tale formazione, in contatto stratigrafico per alternanza sulle argille subappennine, mostra caratteri di facies di mare sottile con evoluzione da ambiente di piattaforma-transizione a shoreface; in basso, verso ambienti di avanspiaggia ghiaiosa o sabbiosa, in alto, verso ambienti di spiaggia emersa e di duna. Lo spessore è molto variabile, fino a un massimo di circa 200 metri. Sulla base di quanto finora precisato, la formazione è riferibile ad un ambiente bacinale di mare profondo prevalentemente sabbioso della stessa formazione. A tali corpi conglomeratici è stato attribuito il rango di lenti (SBC_{MTM}). Lo spessore complessivo della formazione è di circa 60 metri.
PLEISTOCENE INF.

SBC_{SA} - conglomerato di Sant'Antonio Abate: conglomerati in appoggio erosivo su facies sabbiose formanti un corpo cuneiforme cinematicamente con foreset inclinati fino a un massimo di circa 25°-25°. Tali conglomerati sono riferibili ad un sistema deltizio che si sviluppa per la gran parte in ane esterne al foglio. Lo spessore è di circa 60 metri.

SBC_M - conglomerato di Masseria Cecere: conglomerati in bruno contatto basale su facies sabbiose riferibili ad un delta dominato dalle onde che si sviluppa essenzialmente in aree esterne al foglio. Lo spessore affiorante è localmente di circa 20 metri.

SBC_{SM} - conglomerato di Serra Siggiano: conglomerati affioranti nella porzione sommitale di una piccola collina isolata ed i cui versanti sono dominati da facies fini e ben viste di tipo A sequoia sulle facies sabbiose sottostanti. I caratteri di facies fanno ritenere tali depositi ad un sistema deltizio. Lo spessore vara fino a un massimo di circa 30 metri.

SBC_{MT} - conglomerato di Masseria D'Amati: conglomerati in appoggio brusco ma di contrasto su facies sabbiose. Verso Valle Sigiano affioramenti e discontinui. Tali conglomerati sono riferibili ad un sistema deltizio e passano distalmente e verso fallo a facies sabbiose. Lo spessore massimo affiorante è di circa 9-10 metri.

SBC_{SG} - conglomerato di Grassano: depositi conglomeratici formanti un corpo cuneiforme in contatto brusco ma di contrasto su facies sabbiose. Tali depositi sono riferibili ad un sistema deltizio che si sviluppa per la gran parte in affioramenti da un piccolo delta di tipo GILBERT, dominato dalle onde, passante verso fallo ad ambienti di spiaggia ed infine ad ambienti continentali. Distalmente passa a facies sabbiose che lo ricoprono nella sua porzione più profonda. Lo spessore massimo affiorante è di circa 12 metri.

SBC_{SB} - conglomerato di Madonna della Pietà di Irsina: depositi conglomeratici in erosione su facies sabbiose e localmente sulle argille subappennine. Si tratta di un corpo cuneiforme che caratterizza la parte vecchia dell'abitato di Irsina e che presenta foreset inclinati fino a 30°. Tale corpo è riferibile ad un delta di tipo GILBERT, dominato dalle onde. Lo spessore vara fino ad un massimo di circa 60 metri.

SBC_{SL} - conglomerato di Gliumentalrizzo: conglomerati con rare intercalazioni arenacee, clinostratificati con foreset immergenti verso i quadranti settentrionali. Costituiscono un corpo intercalato a facies sabbiose nella parte alta del versante della collina di Venturoli. L'ambiente è riferibile ad un sistema ghiaioso deltizio. Lo spessore è di circa 8 metri.

ARGILLE SUBAPPENNINE — ASP, ASP$_1$
Argille siltose e siltsabbiosi di colore grigio-azzurro, a luoghi con intercalazioni sabbiose o più raramente conglomeratiche, in strati di spessore variabile da pochi centimetri ad oltre un metro. I caratteri di facies sono indicativi di ambienti di piattaforma s.l. o di rampa. Lo spessore complessivo affiorante è di circa 400 metri. Nella parte alta della formazione è presente uno spesso membro conglomeratico (ASP$_1$). *PLIOCENE SUP. - SICILIANO* - zona a *Bulimina marginata*, zona a *Hyalinea balthica*, zone MNN15c, MNN15d e MNN15e .

Conglomerato di Serra del Cedro
Conglomerati poligenici con intercalazioni sabbiose e/o sabbioso-argillose. Questo membro costituisce un corpo lenticolare che si assottiglia verso NE (verso l'antico offshore). Conseguentemente lo spessore affiorante varia da un massimo di circa 400 metri a pochi metri. Dati di profondità indicano uno spessore di conglomerati di circa 1200 metri. I caratteri di facies dei depositi affioranti sono riferibili alla parte subacquea di un fan delta.
EMILIANO

UNITÀ DEI BACINI INTRAPPENNINICI
SUPERSINTEMA DI ARIANO IRPINO (AR)

In tale supersintema ricadono tutti i depositi di età compresa fra il *PLIOCENE INF.* e il *PLEISTOCENE INF.* in posizione di wedge top-basin, che si rinvengono in discordanza su unità più antiche poste all'interno o sul fronte della catena. Gli elementi che fanno supersintema nell'area del Foglio Irsina e sono distinti il sintema di Tricarico e il sintema di Tolve.
PLIOCENE INF. - PLIOCENE SUP.

SINTEMA DI TOLVE (TLV)
SUBSINTEMA DI ACERENZA (TLV_2)
Litofacies argilloso-siltosa: argille siltoso-sabbiose grigio piombo, ricche di microfaune, a cui si intercalano sottili livelli siltosi e strati arenacei. Lo spessore vara da luogo a luogo e, anche in base a dati di profondità, quello massimo risulta di circa 30 metri. Tale litofacies è riferibile ad ambienti di shoreface-transizione alla piattaforma. *PLIOCENE MEDIO p.p. - PLIOCENE SUP.* - zona a *Bulimina marginata*, zona ad *Anomalinoides helicinus*, zone MNN16-17 e MNN18.

Litofacies arenaceo-sabbiosa: areniti, areniti ibride e calcareniti bioclastiche ricche di macrofossili interi o in frammenti. Si tratta di depositi ben stratificati secondo superfici piano-parallele; la porzione superiore è caratterizzata da areniti ibride con cinoritmi inclinati fino a circa 30°. La litofacies è riferibile ad ambienti di mare basso, localmente interessati da processi di amplificazione tidale. Lo spessore massimo è di circa 60 metri.
PLIOCENE MEDIO p.p.

SUBSINTEMA DI POTENZA (TLV_1)
Litofacies arenacea: areniti e arenarie quarzose-subfeldspatiche alternanza di arenarie e sabbie ricche di frammenti di macrofossili, con rare intercalazioni di strati calcarenitici passanti verso fallo a conglomerati, prima disorganizzati e successivamente meglio organizzati. Gli ambienti sono riferibili a sistemi di transizione. Localmente la parte medio-bassa della litofacies è caratterizzata da un conglomerato matrice-sostenuto estremamente caotico con blocchi di diametro anche metrico. Questi ultimi depositi possono essere riferiti a frane lungo coste rocciose. Lo spessore è variabile da 30 a circa 50 metri. *PLIOCENE MEDIO p.p.*, zona a *Globorotalia crassaformis*.

SINTEMA DI TRICARICO (TCR)
Litofacies argillosa: argille siltoso-sabbiose, ricche in micro- e macrofauna, con intercalazioni di strati arenitici alla base riarenitiche o osservano livelli conglomeratici. Tali depositi sono riferibili ad ambienti di piattaforma prodelta. Lo spessore totale è di circa 100 metri. *PLIOCENE INF.* - dalla zona a *Globorotalia margaritae/G. punctulata* alla zona a *Globorotalia puncticulata*, limite fra la zona MNN14/15 e base MNN16a.

Litofacies arenaceo-conglomeratica: conglomerati clasto-sostenuti (non sempre presenti) con scarsa matrice sabbiosa ed intercalazioni arenacee, più raramente pelitiche, passanti ad arenarie stratificate in banchi spessi fino a 2 metri, a luoghi amalgamati, con livelli conglomeratici. Si osservano abbondanti macrofossili. Tali litofacies è riferibile ad ambienti di transizione (di spiaggia e deltizi). Lo spessore complessivo è di circa 50 metri. *PLIOCENE INF.* - zona a *Globorotalia margaritae* (?)

UNITÀ TETTONICHE DELLA CATENA APPENNINICA
UNITÀ TETTONICA DI VAGLIO DI BASILICATA

FLYSCH NUMIDICO — FYN
Quarzareniti e subarcosi grigio-giallastre, rossastre per alterazione, in strati e banchi di spessore variabile dal decimetro fin oltre il metro, a cui si intercalano sottili livelli grigio-verdastri di argilliti marnose. La granulometria delle areniti è medio-fine e le strutture sedimentarie sono riferibili ad associazioni di facies di lobo di conoide sottomarina. Lo spessore massimo affiorante è variabile fino a circa 700-800 metri. *BURDIGALIANO* - la parte più bassa della formazione è riferibile alla zona MNN3c.

FLYSCH ROSSO — FYR
Argilliti scagliettate di colore variabile (rosso, grigio o verde) in fitta alternanza con calcareniti, calciruditi e calcisiltiti in strati di spessore variabile da centimetrico a granulometria variabile da media a grossolana, sono gradate e, verso fallo, presentano laminazione piano-parallela ed obliqua a vario angolo; le calciruditi sono caratterizzate dalla presenza di frammenti di macrofossili e da macroforme erosionalmente immarcagiate. Le facies sono riferibili a depositi torbiditici; lo spessore è dell'ordine di 300 metri.
VALANGINIANO SUP. (?) - AQUITANIANO

Membro Diaspidoro
Argilliti scagliettate di colore variabile dal grigio-verde al rossastro con intercalazioni di rari strati di calciruditi, calcareniti e rarie silicizzate. Nella parte media-alta del membro è presente in modo discontinuo il Livello Bonarelli (**A**), spesso circa 1 m, costituito da una fitta alternanza di diaspri, argilliti rosse e verdi ed argilliti bituminose *(black shale)* e caratterizzato da una colorazione nerastra e radiolariti indicative del passaggio *CENOMANIANO-TURONIANO*. Le caratteristiche di facies sono riferibili ad ambienti bacinali, a luoghi interessati da torbiditi distali; lo spessore del membro è dell'ordine di 200 metri.
VALANGINIANO SUP. (?) - TURONIANO INF.

FLYSCH GALESTRINO — FYG
Argille grigie o more calcaree a cui si intercalano calciruditi, calcareniti a granulometria medio-fine e marne siltoscalci; queste ultime presentano il tipico aspetto della pietra paesina, mentre le calcareniti presentano strutture riconducibili alla sequenza di BOUMA. Nel complesso la formazione è riferibile ad un ambiente bacinale di mare profondo prevalentemente interessato sia da sedimentazione emipelagica che da correnti di torbida diluite. Lo spessore affiorante è dell'ordine di 150 metri.
CRETACICO INF.

UNITÀ TETTONICA DI SAN CHIRICO

ARGILLE SILTOSE DEL TORRENTE FLAGA — TFA
Marne ed argille marnose grigio scure a cui si intercalano rari e sottili strati di areniti fini, sia a composizione prevalentemente quarzosa che calcarea, e rari livelli di calcareniti bianche; i caratteri sedimentologici portano a ritenere questi depositi ad un ambiente a sedimentazione emipelagica, caratterizzato dall'arrivo di torbide diluite a granulometria fine. Lo spessore affiorante è dell'ordine di 50 metri.
SERRAVALLIANO p.p. - TORTONIANO.

FORMAZIONE DI SERRA PALAZZO — PRA_a, PRA_m, PRA_b
È costituita da una successione torbiditica silicoclastica (membro di Vallone Fortuso - PRA_b) a cui si intercalano verso l'alto (membro di Masseria Cupo - PRA_m) corpi arenacei a geometria lenticolare e (membro di Serra Palazzo - PRA_a) corpi arenacei a geometria tabulare. Lo spessore totale affiorante della formazione è di 600 - 800 metri. *BURDIGALIANO SUP. - SERRAVALLIANO p.p.*- Associazioni a foraminiferi con *Globigerinoides bisphericus* e *G. trilobus*, pre-*Orbulina universa* nelle parti basali, e associazioni a nannofossili calcarei riferibili al limite fra le zone MNN6b e MNN7, nelle parti alte.

Membro di Pantano del Gamberi
Filta alternanza di torbiditi calcicalcisiltiche a grana medio-fine (costituiscono il 50% del membro), torbiditi siliciclastiche a grana fine e marne siltose. Le litofacies più rappresentate indicano un ambiente di conoide sottomarina esterna. Lo spessore massimo del membro raggiunge i 500 metri. Nella parte basale del membro è stata distinta una litofacies costituita da calcareniti di piattaforma carbonatica erosiva associati a facies carbonatiche riconducibile a slump. *LANGHIANO SUP. - SERRAVALLIANO p.p.*- associazioni a foraminiferi con *Orbulina universa* e *Globigerinoides trilobus*, nelle parti alte, limite fra le zone a nannofossili calcarei MNN6b e MNN7.

Membro di Vallone Fortuso
Arcosi ed arcosi litiche con abbondante matrice e cemento carbonatico a cui si alternano sottili strati di argille siltose e rare areniti calcisiltiche a grana grossolana costituite sia da embriaciti che da intraclasti. Si presenta in strati di spessore variabile da alcuni decimetri ai metro e banchi amalgamati, spessi fino a 6 m, con geometria lenticolare. Le litofacies più rappresentate indicano ambienti di conoide sottomarina interna ed intermedia. Lo spessore massimo del membro raggiunge i 700 metri. *BURDIGALIANO SUP. - LANGHIANO* - associazione a foraminiferi con *Globigerinoides trilobus* e *G. bisphericus*, pre-*Orbulina universa*.

FLYSCH DI FAETO — FAE
Alternanza di torbiditi calcaree a grana medio-fine di colore biancastro alternate a calciruditi e marne calcaree di colore variabile dal grigio chiaro al bianco, in strati di spessore variabile da pochi centimetri ad alcuni decimetri. Le torbiditi calcaree sono caratterizzate da base erosiva e da strutture sedimentarie di tipo A BOUMA. Le marne siltose si trovano in sottili livelli di torbida poco concentrate. Il flysch di Faeto poggia con contatto stratigrafico concordante sul flysch numidico e passa in alto per alternanza alla formazione di Serra Palazzo. Lo spessore è dell'ordine di 100 metri.

FLYSCH NUMIDICO — FYN
Quarzareniti e subarcosi grige, gialle per alterazione, in strati e banchi di spessore variabile dal decimetro fino al metro, a cui si intercalano sottili livelli grigio-verdastri di argilliti marnose. La granulometria delle areniti è medio-fine e le strutture sedimentarie sono riferibili ad associazioni di facies di lobo di conoide sottomarina. Lo spessore massimo affiorante è di circa 200 metri. *BURDIGALIANO* zona MNN2b nelle parti basali della formazione.

FLYSCH ROSSO — FYR
Argilliti di colore variabile dal grigio-verde al rossastro, con intercalazioni di rari strati di calciruditi, calcareniti e marne siltocalcari. Nella parte media-alta del membro è presente in modo discontinuo il Livello Bonarelli, A nere alleccie e rinvengono strati anche di notevole spessore di calcareniti e calciruditi, a luoghi francamente a base erosiva. Le facies sono riferibili ad ambienti bacinali a luoghi interessati da correnti di torbida. Lo spessore è di oltre 200 metri.
CRETACICO SUP.(?) - AQUITANIANO









FYG: Flysch Galestrino; FYR: Flysch Rosso; FYS= membro diaspridno del Flysch Rosso; FYN: flysch numidico; FAA: formazione di Serra Palazzo; TFA: argille siltose del Torrente Flaga; AR: supersintema di Ariano Irpino; bi bacini intrappenninici; ASP: argille subappennine; SBC: formazione di Monte San Marco; fb: Fossa bradanica.

Cretacico inf.-Burdigaliano

Cretacico sup.-Tortoniano

SOVRASSEGNI DELLE UNITÀ QUATERNARIE

- depositi ghiaiosi o ghiaioso-sabbiosi alluvionali
- depositi sabbioso-ghiaiosi alluvionali
- depositi sabbioso-limosi alluvionali

SIMBOLOGIA

- strati diritti
- strati orizzontali
- strati rovesciati
- strati a polarità sconosciuta
- strati verticali
- contatto stratigrafico certo, incerto
- contatto stratigrafico inconforme certo, incerto
- faglia certa, incerta
- faglia diretta certa, incerta
  i trattini indicano la parte ribassata
- faglia trascorrente destra certa, incerta
  la freccia indicano il senso di taglio
- faglia transtensiva destra certa, incerta
  le freccie indicano il senso di taglio
- sovrascorrimento certo, incerto o sepolto
  i triangoli indicano la parte sovrascorsa
- orlo di scarpata di frana
- superficie assiale di sinclinale certa, incerta
- superficie assiale di anticlinale certa, incerta
- conoide alluvionale
- affioramento di interesse stratigrafico
- pozzo per ricerca idrocarburi
- sondaggio per ricerca mineraria
- traccia di sezione geologica

Stampa: SYSTEMCART Srl - 2017

Foglio con Nota illustrativa

Banca dati ed allestimento cartografico digitale: SYSTEMCART Srl, Roma